



Гайдуков В.А.

ВИКОРИСТАННЯ ГОРОБЕЙНИКА ЛІКАРСЬКОГО (LITHOSPERMUM OFFICINALE) У ХВОРІХ НА ХРОНІЧНИЙ ХОЛЕЦІСТИТ

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти.

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

Обстежено 58 хворих на холецистит (37 жінки і 21 чоловік) віком 20-66 років; тривалість захворювання складала 0,5-20 років. Діагноз підтверджували загально-клінічними даними, результатами сонографії жовчного міхура (об'єм жовчного міхура вираховували за формулою Everson G.T., ефективність його моторики оцінювали за коефіцієнтом скорочення (КС); мікроскопії жовчі та її біохімічним складом (вмістом холатів, холестерину, білірубіну, визначення холатохолестеринового коефіцієнту). Горобейник лікарський (ГЛ) використовували в комплексному лікуванні у вигляді розчину спиртової 40° настоїнки (1:10) по 20 крапель на 60 мл теплої дистильованої води.

Як показали результати дослідження, використання ГЛ у багатьох хворих прискорювало нормалізацію біохімічного складу жовчі - зростав вміст жовчних кислот, зростав холато-холестериновий коефіцієнт. Вживання настоянки ГЛ приводило до холецистокінетичного ефекту. У пацієнтів із нормальним об'ємом жовчного міхура скорочення відбувалося на 56 хвилині і КС був максимальним – 64,0±2,3%, тоді, як у хворих з гіпотонічною дискинезією холецистокінетичний ГЛ ефект був слабшим (КС – 38,2±2,1) ($p<0,05$).

Застосування ГЛ сприяло зникненню важкості у правому підребер'ї, менше турбувала гіркота у роті. нормалізувались випорожнення. Вище зазначені зміни перебігу хвороби дозволили скоротити час перебування пацієнтів у стаціонарі на 2 дні. Застосування настоянки ГЛ на амбулаторному етапі лікування пацієнтів в осінньо-весняний період зменшувало кількість загострень при хронічному перебігу хвороби.

Гайдуков В.А.

ВПЛИВ ГОРОБЕЙНИКА ЛІКАРСЬКОГО (LITHOSPERMUM OFFICINALE) НА СЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ШЛУНКА У ХВОРІХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРОДУОДЕНІТ

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти.

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

Обстежено 52 хворих, на безмедикаментозному фоні використовували горобейник лікарський (ГЛ) у вигляді спиртової (50%) настоїки (1:10) по 10 крапель на 60 мл теплої дистильованої води. Кислотоутворюючу функцію шлунка вивчали методом інтрагастральної мікрозондової pH-мертії, а морфологічні зміни слизової шлунка – з допомогою гастродуоденофіброскопії з прицільною біопсією на рівні тіла і антрального зіddіу шлунка. Під час фармакологічної проби досліджували лагетний період, період наростання дії ГЛ, період плато, загальну тривалість дії препарату.

Прийом ГЛ викликає статистично достовірний зсув pH у кислу зону на рівні тіла шлунка при початковій нормоацідності та помірно знижений інтенсивності кислотоутворення. Пояслення кислотостимулюючого ефекту спостерігали у хворих з помірно селективною гіпоацідністю, менший – з абсолютною і субтотальною. У 66% хворих прийом настоянки ГЛ стимулював шлункове кислотоуттворення незалежно від показників базального pH. У 14 пацієнтів не відмічали подібної реакції, що було позначено з наявністю атрофічних змін слизової оболонки шлунка і вираженою (гістамінорезистентністю) гіпохлоргідрією.

Отримані дані вказують на необхідність диференційованого підходу до часу прийому ГЛ – при гіпоацідності – за 40 хв. до їди, при нормоацідності – за 20 хв. до їди, при гіперацідності – за 10 хв. За результатами проведених досліджень можна припустити, що ГЛ посилює гастриновий механізм дії та процес кислотоутворення.

Гончарук Л.М., Федів О.І., Гресько С.О.*

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ HELICOBACTER PYLORI-АСОЦІЙОВАНИХ ГАСТРОДУОДЕНОПАТИЙ, ІНДУКОВАНИХ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМІ ПРЕПАРАТАМИ, У ХВОРІХ НА ОСТЕОАРТРОЗ

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

ОКУ «Обласна клінічна лікарня», м. Чернівці*

Старіння населення в усьому світі протягом останніх десятиріч привело до зростання захворюваності на остеоартроз (ОА). Захворювання, як правило, виявляють у пацієнтів старше 50 років. 80% людей старше 75 років страждають цією патологією. Серед фармакотерапевтичних засобів непохідні позиції при лікуванні ОА на сьогодні утримають нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). Виразки шлунка або дванадцятипалої кишki виявляють у 10-15% пацієнтів, що регулярио приймають НПЗП, а шлунково-кишкова кровотеча та перфорація впродовж року може розвинутись в 1-1,5% випадків.

Мета роботи - підвищити ефективність лікування Helicobacter pylori-асоційованих гастродуоденопатій, індукованих НПЗП, у хворих на остеоартроз.