

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Науково-практичний
загальномедичний журнал

Засновник і видавець
ТОВ «МОРІОН»

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 642 від 22.10.2001 р.

Співзасновник

Національна медична академія
післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика
МОЗ України

Виходить 6 разів на рік

Заснований у жовтні 1997 р.

№ 6 (98) 2013

Рекомендовано

Вченюю радио Національної медичної
академії післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика
МОЗ України

Протокол № 9 від 11.12.2013 р.

Головний редактор

І.С. Зозуля

Редакційна рада:

Ю.Г. Антипін, Д.А. Базика,
В.Г. Бебешко, В.В. Бережний,
О.Є. Березін, В.О. Бобров,
А.В. Борисенко, Ю.П. Вдовиченко,
В.А. Візір, С.М. Віничук,
О.Ф. Возіанов, П.В. Волошин,
Ю.В. Вороненко, Ю.О. Гайдаєв,
С.М. Гайдукова, В.В. Гебеш, Т. Гіббс
(Великобританія), Н.Г. Гойда,
Ю.І. Головченко, Є.М. Горбань,
Н.Г. Горовенко, С.К. Євтушенко,
В.А. Загорій, Д.Д. Зербіно, Ю.П. Зозуля,
Л.Д. Каложна, В.М. Коваленко,
В.Г. Коляденко, В.М. Короткий,
А.Л. Косаковський, Б.П. Криштопа,
В.М. Кузнецов, К.М. Логановський,
А.В. Макаров, В.О. Маланчук,
О.П. Мінщер, В.А. Міхньов,
В.Г. М'ясников, О.К. Напреєнко,
В.С. Онищенко, О.М. Пархоменко,
Є.Г. Педаченко, Л.А. Пиріг,
М.Є. Поліщук, Ю.В. Поляченко,
М.Г. Проданчук, А.П. Радзіковський,
Л.Г. Розенфельд, А.Ю. Романенко,
І.З. Самосюк, М.М. Сергієнко,
А.М. Сердюк, В.П. Сільченко,
Л.В. Усенко, П. Фльор-Генрі (Канада),
Н.В. Харченко,
Т. Хельбрюгте (Німеччина), А.А. Чумак,
Н.І. Швець, І.П. Шлапак

Секретаріат:

К.Л. Юр'єв

(відповідальний секретар),
А.К. Жигунова, О.А. Федорова,
І.Б. Щербак

Київ • МОРИОН • 2013

ЗМІСТ

ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

3-28

3 Новим роком та Різдвом Христовим! 4

VI Национальный конгресс ревматологов Украины:
вектор на доказательную медицину, системный
подход и партнерство с пациентом

О. Федорова 5

Достижения и перспективы развития кардиохирургии
(по материалам Научной конференции, посвященной
100-летнему юбилею Николая Михайловича Амосова)

А. Жигунова 10

Борьба с инсультом: состояние медицинской помощи
в Украине и опыт зарубежных коллег

А. Жигунова 13

2013-й – год разочарований и надежд кардиологии

А. Жигунова 17

Всемирный день диабета – 2013 в Украине:
курс на диабетологическое просвещение и профилактику

И. Щербак 20

Рынок частной медицины в Украине: маркетинг
и менеджмент как инструменты конкурентной борьбы

А. Бармина 22

Новые горизонты гинекологической хирургии

А. Жигунова 25

АКТУАЛЬНО

29-40

Стратегія подолання ВІЛ-інфекції в Україні:
професійний погляд на проблему

О. Устінов 30

Особливості молекулярних механізмів розвитку
неалкогольної жирової хвороби печінки

А.А. Чумак, Л.М. Овсяннікова, А.В. Кубашко, Е.О. Саркісова,
О.В. Гасанова, С.М. Альохіна, О.Я. Плескач 33

ДІСТАНЦІЙНА ОСВІТА

41-60

Выбор антибиотикотерапии при сочетании острых
инфекций верхних и нижних дыхательных путей

Л.В. Юдина 43

Аллергический ринит: этиология, патогенез, клинические
проявления и патогенетически обоснованная терапия

А.Л. Косаковский, Ю.В. Гавриленко 48

Вплив інсульнорезистентності на серцево-судинні
захворювання у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
та методи її корекції

Н.М. Жердьова 53

Инсулиноподобные препараты с применением генно-инженерных
препараторов человеческого инсулина: новые возможности

Л.К. Соколова 57

ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ

61-68

Цефодокс в терапии бронхолегочных заболеваний у взрослых
и детей: клиническая эффективность и безопасность

И.Б. Щербак 62

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 16973-5743 ПР
від 08.09.2010 р.

Атестовано
Вищою атестаційною комісією
України
Переліки постанов Президії ВАК
№ 01-05/9 від 08.09.1999 р.
№ 01-05/5 від 01.07.2010 р.
Адреса редакції та видавця:
02140, Київ-140,
просп. М. Бажана, 10А
Тел./факс: (44) 585-97-10
(багатоканальний)
Поштова адреса:
01001, Київ-1, а/с «В»-82,
ТОВ «МОРІОН»
E-mail: PUBLIC@MORION.UA
Internet: http://www.umj.com.ua

Підписано до друку 27.12.2013 р.
Формат 60×84 $\frac{1}{8}$.
Папір крейд. матовий.
Ум. друк. арк. 14,88.
Обл.-вид. арк. 20,5.
Загальний наклад 35 500 прим.
Зам. № 4658.

Видрукувано
у ТОВ «ВКФ ТРИАДА»
03680, Київ, вул. Кржижановського, 4

Передплатити
**«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ
ЧАСОПИС»**
можна в будь-якому поштовому
відділенні.
Передплатний індекс — 48348.

Цілковите або часткове
розмножування в будь-який спосіб
матеріалів, опублікованих у цьому
виданні, допускається лише
з письмового дозволу редакції.
Відповідальність за зміст реклами
матеріалів несе рекламодавець.
Знаком □ помічено матеріали,
що публікуються на правах реклами.

© ТОВ «МОРІОН», 2013

Ефективность жаропониждающих препаратов при лихорадочных состояниях у детей

В.В. Бережной, В.Г. Козачук 65

ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА

69–94

Формальные критерии качества и ценности клинической информации

К.П. Воробьев 70

Гиполипидемическая терапия в стратегии первичной и вторичной профилактики атеротромботических кардиоваскулярных событий

А.Е. Березин 79

Обзоры сравнительной эффективности медицинских вмешательств AHRQ

К.Л. Юрьев 84

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

95–118

Досвід удосконалення підготовки керівників галузі охрані здоров'я з питань менеджменту якості медичної допомоги

Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда, В.В. Горачук 96

Синдром Марфана: дослідження пацієнтів після операції з приводу гострого розшарування аневризми висхідного відділу аорти

Р.К. Жураєв, Г.В. Книшов, Д.Д. Зербіно,
І.М. Кравченко, В.І. Кравченко 99

Оцінка гемодинаміки в ділянці підочної артерії при переломах вилицевого комплексу

В.О. Маланчук, Н.М. Тімошенко, Р.О. Мамонов 102

Особливості захворюваності населення Сумської області

В.Д. Шищук, В.А. Сміянов 104

Восстановительное лечение пациентов с неврологическими формами болезни Вильсона — Коновалова

И.К. Волошин-Гапонов 107

Піровиноградна кислота в комплексі метаболічних порушень у пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою легень, ускладненою хронічним легеневим серцем

О.І. Ременник 112

Структурно-функціональний стан правого передсердя та його вушка у хворих із неклапанною фібриляцією передсердь

Я.М. Логвінов, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалев, О.А. Єпанчинцева 114

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

119–123

Роки звитяги: діяльність М.М. Амосова в Українському НДІ туберкульозу ім. академіка Ф.Г. Яновського (до 100-річчя від дня народження М.М. Амосова)

А.М. Приходько 120

МЕДИЧНЕ ПРАВО

125–128

Анатомічні матеріали померлої людини: презумпція згоди

В.М. Пашков 126

К.В. Садогурська¹, В.Г. Каплуненко², І.С. Чекман³¹Буковинський державний медичний університет, Чернівці²Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження

Державного агентства резерву України, Київ

³Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Хром і нанохром: властивості, перспективи застосування у медичній практиці

В оглядовій статті наведено сучасні дані про мікроелемент хром (Cr^{3+}), його природні джерела, фізіологічну роль в організмі людини, метаболізм та екскрецію. Хром є компонентом фактора толерантності до глукози — органічного комплексу, який разом з інсуліном бере участь у регуляції метаболізму вуглеводів шляхом оптимізації виділення інсуліну та його зв'язування з відповідними мембраними рецепторами. Наведено дані щодо норм споживання хруму та вмісту його у продуктах харчування, а також його застосування при різних патологіях. Окреслено перспективи використання наночастинок хруму, біологічна активність яких значно вища.

Ключові слова: мікроелементи, хром, глукоза, толерантність, інсулін, нанохром.

Мікроелементи — група хімічних елементів, які становлять $<0,01\%$ маси тіла людини; вони входять до складу або здатні впливати на активність багатьох важливих ферментів, гормонів і вітамінів. Останнім часом значну увагу приділяють освоєвостям взаємодії мікроелементів як актуальній медико-біологічній проблемі (Трахтенберг І.М. та співавт., 2013). Ефективність використання мікроелементів організмом визначається рівнем збалансованості раціонів щодо поживних і біологічно активних речовин, ступенем засвоєння, депонуванням та взаємодії мікроелементів між собою, з іншими харчовими елементами у процесі всмоктування, транспорту і екскреції (Харченко О.О., 2012).

Дефіцит навіть одного з мікроелементів або зміна їхнього співвідношення може привести до порушення збалансованої роботи всього організму та до розвитку патологічних станів (Тронько М.Д., Щербак О.В., 2002). При недостатньому надходженні мінеральних компонентів організм може лише певний час поповнювати створений дефіцит шляхом мобілізації їх із тканинних депо, а при надмірному надходженні — підвищеним виведенням. Враховуючи ці дані, можна зрозуміти необхідність вивчення обміну мікроелементів при різних захворюваннях і пошуку шляхів нормалізації мікроелементного балансу (Нейко Є.М., 2008).

Дослідження, опубліковані протягом останніх 50 років, переконливо довели, що хром є одним із найважливіших для людського організму мікроелементом (Vipsent J.B., 2010).

Знаходження та поширення у природі хруму

Хром (Cr) — хімічний елемент VI В групи побічної підгрупи із атомним номером 24

періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва. Це важкий метал з атомною масою 51,996, який міститься у земній корі (0,03%), морській воді (0,05–0,5 мкг/л) (Снітинський В.В. та співавт., 1999). Хром у довкіллі немає ін в чистому, ні в самородному вигляді, а лише у вигляді сполук з іншими елементами (хроміт заліза, алюмохроміт, магнезіохроміт тощо). Тривалентний хром (Cr^{3+}) знаходиться у формі гідроксокомплексів в біологічних системах і є життєво необхідним для людини і тварин (Morris B.W., 1999; Іскра Р.Я., Янович В.Г., 2011а).

Всмоктування та засвоєння хруму

В організмі дорослої людини міститься приблизно 6 мг хруму (Pechova A., Pavlata L., 2007). Всмоктування Cr^{3+} із травного тракту здійснюється шляхом слабкої дифузії в тонкому кишечнику, проте слід пам'ятати, що фізіологічне засвоєння цього мікроелемента не перевищує 0,4–0,7%. Хром, який абсорбується, розподіляється між органами і тканинами нерівномірно, концентруючись у нирках, печінці, селезінці, легенях, волосці, щитоподібній залозі та кістках (Мерецький В., Шманько В., 2007).

Багато факторів впливають на засвоєння Cr^{3+} в організмі людини, а саме: за участю аскорбінової кислоти відбувається відновлення шестивалентного хруму (Cr^{6+}) у нирках та печінці; вітаміни групи В підвищують абсорбцію хруму в кишечнику; цинк і залізо посилюють активність хруму в організмі; карбонат кальцію може зменшувати всмоктування хруму, що, в свою чергу, призведе до дефіциту зазначеного мікроелемента (Іскра Р.Я., Янович В.Г., 2011б).

Виділення хруму з організму

Екскреція Cr^{3+} з організму людини відбувається переважно нирками із сечею,

а також із потом, жовчю, грудним молоком (Стешанюк В.Д., 2001). Частина хруму, яка не всмоктується (98–99%), виводиться із випорожненням кишечнику (Щербак С.О. та співавт., 2002). З'ясовано, що при фізичному навантаженні у людей, особливо нетренованих, при деяких захворюваннях (інфекційних, цукровому діабеті) та при різних стресових ситуаціях відбувається посилене виділення хруму з сечею (Снітинський В.В. та співавт., 1999). Встановлено, якщо в сечі Cr^{3+} майже не виявляють, а в крові його концентрація відносно висока ($>20 \text{ мкг\%}$), може бути зроблений висновок, що відбувається затримка хруму в організмі (Стешанюк В.Д., 2001).

Рекомендована добова доза

Добова потреба хруму для людини становить 50–200 мкг (Іскра Р.Я., Влізло В.В., 2013). За даними літератури, в людині існує певний ступінь насичення тканин організму Cr^{3+} , що залежить від віку і функціонального стану та визначає добову потребу в цьому мікроелементі. Вміст хруму в органах і тканинах людини значно знижується з віком (на 25–40%), а також у період вагітності. У табл. 1 наведені норми хруму для людини залежно від віку і функціонального стану, рекомендовані Національною дослідною радою США (National Research Council — NRC).

Надходження Cr^{3+} до організму здійснюється з їжею, тому слід звертати увагу, чи достатньо у раціоні продуктів, які є джерелами цього мікроелемента. До продуктів із підвищеним вмістом цього мікроелемента можна віднести рибу, яловичину, печінку, м'ясо птиці, яйця, пивні дріжджі, овочі та фрукти (табл. 2).

Менша кількість хруму міститься у таких продуктах, як цукор-рафінад, рис, пшеничне борошно дрібного помелу та випечений із нього хліб. Незбалансований

раціон харчування знижує засвоєння хрому і може стати причиною хронічної втоми, яка розвивається внаслідок підвищеного рівня глюкози у крові (Мерецький В., Шманько В., 2007; Зубкова С.Т., Музь В.А., 2010).

Фізіологічна роль хрому

Важлива роль хрому полягає в регуляції вуглеводного обміну, оскільки Cr^{3+} є компонентом низькомолекулярного органічного комплексу — фактора толерантності до глюкози (glucose tolerance factor — GTF) (Jeejeebhoy K.N., 1999). Основним білком-носієм для Cr^{3+} є трансферин. У клітині чотири атоми Cr^{3+} формують комплекс із олігопептидом апохромомодуліном, утворюючи хромомодулін, який взаємодіє із внутрішньоклітинною частиною активованого рецептора інсуліну (тироzinіназою), підсилюючи ефект інсуліну (Vinsent J.B., 2000; Ye J., Shi X., 2001; Sefalu W.T., Hu F.B., 2004). Крім того, хром є кофактором для інсуліну на плазматичній мембрані і допомагає підтримувати нормальній рівень глюкози у крові шляхом регуляції синтезу інсуліну. Посилення дії інсуліну відбувається без зміни кількості самого гормону і залежить від вмісту Cr^{3+} (Щербак С.О. та співавт., 2004; Мерецький В., Шманько В., 2007).

Основні фізіологічні функції Cr^{3+} такі (Снітинський В.В. та співавт., 1999; Мерецький В., Шманько В., 2007; Іскра Р.Я., Янович В.Г., 2011а):

- впливає на вуглеводний обмін (підтримує нормальний рівень глюкози у крові, знижує потяг до солодких продуктів, сприяє зменшенню надлишкової маси тіла);
- бере участь у регуляції роботи серцево-судинної системи (нормалізує артеріальний тиск, знижує рівень жирних кислот і холестерину у плаазмі крові);
- сприяє синтезу та відповідає за цілісність структур нуклеїнових кислот (РНК і ДНК);
- при взаємодії з йодом підтримує функціонування щитовидної залози;
- сприяє нормалізації функції та структури кісток, профілактиці сотовогорозу;
- впливає на імунну систему: знижує рівень кортикостероїдів у крові, які пригнічують імунітет;
- позитивно впливає на тривалість життя і процеси старіння (збільшення тривалості та поліпшення якості життя);
- виводить із організму токсини, солі важких металів, радіонукліди.

Терапевтична цінність Cr^{3+} визначається також при інших станах та захворюваннях: він сприяє зменшенню вираженості хронічного головного болю, використовується для лікування при вугровій висипці (зумовленій порушенням обміну інсуліну). У комплексному лікуванні з вітаміном С знижує внутрішньочинний тиск при глаукомі (Mahmoud A.A. et al., 2006).

Велике значення надають розробці методів усунення дефіциту хрому. Оскільки Cr^{3+} не синтезується в організмі, нормальній перебіг біохімічних процесів і функціонування всього організму в цілому прямо залежить від його надходження ззовні. Зокрема, поповнення цього мікроелемен-

та аліментарним шляхом не завжди можливе, тому біологічно активні добавки, до складу яких входить хром, знайшли широке застосування в клінічній практиці. Перспективним щодо цього є хрому піколінат, який є органічною сполукою зазначеного мікроелемента. Опубліковані результати клінічних досліджень, які свідчать про доцільність проведення тривалих лікувально-профілактичних курсів хрому піколінату при цукровому діабеті, серцево-судинних захворюваннях за умов виявлення та діагностування дефіциту хрому (Anderson R.A., 1998; Ye J., Shi X., 2001).

Дефіцит та надлишок хрому в організмі

У разі недостатності або надлишку хрому в організмі виникають ряд порушень життєво важливих процесів, симптоми яких подібні до тих, що спостерігаються при діабеті та серцево-судинних захворюваннях (Іскра Р.Я., Янович В.Г., 2011а). Дефіцит

хрому може відзначатися у здорових осіб, частіше у підлітковому віці, у період вагітності та лактації. Зменшення вмісту хрому в організмі виявляють також у людей похилого віку (Ekmekcioglu C., 2001). Встановлено, що нестача хрому може сприяти розвитку цукрового діабету, атеросклерозу, периферичної нейропатії, затримці росту, порушенню вищої нервової діяльності, зниженню імунітету, зменшенню тривалості життя, порушенню репродуктивної функції у чоловіків тощо (табл. 3) (Щербак С.О. та співавт., 2002; Маркевич В.Е., Глушченко Н.В., 2010).

Особливу небезпеку для здоров'я становить хронічна експозиція Cr^{6+} . При надходженні його в організм у концентраціях, що перевищують можливості компенсаторних механізмів, можуть розвиватися канцерогенний, алергічний та нейротоксичний ефект. Часто відзначають ураження шкіри (дерматит, екзему), астматичний бронхіт, рідше — бронхіальна астма. При тривалому вдиханні сполук, які містять Cr^{6+} , зростає

Таблиця 1

Популяційна група	Добова потреба у Cr^{3+} за даними NRC	
	Потреба, мкг/добу	
Вік, років	1–3	11
	3–11	15
	11–14	25
	14–18	35
Дорослі		50–200
Вагітні		150–200

Таблиця 2

Тип	Продукт	Джерела Cr^{3+} у раціоні	
		Хром, мкг/100 г	
Тваринного походження	Риба (тунець)	55 (90)	
	Креветки	55	
	Яловича печінка	32	
	Яйця курячі	25	
	Курка	20	
	Свинина	15	
	Качка	15	
	Яйця перепеліні	14	
	Індичка	11	
	Баранина	9	
	Кролик	8	
	Броколі	22	
	Кукурудзяна крупа	22	
	Червоний буряк	20	
	Персики	14	
	Гриби	13	
	Перлова крупа	13	
	Редька	11	
	Квасоля	10	
	Картопля	10	
	Горох	9	
	Вишня	7	
	Солодкий перець	6	
	Огірки	6	
	Лінні дріжджі	10	
Інші			

Таблиця 3

Основні симптоми, пов'язані з дисбалансом хрому		
Симптоми та стани	Дефіцит	Надлишок
Подразнення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту	+	
Запор	+	
Дисбактеріоз	+	
Вугрова висипка	+	
Погіршення пам'яті	+	
Порушення емоціональної сфери	+	
Надлишкова маса тіла	+	
Підвищений рівень глюкози у крові	+	
Порушення з боку серцево-судинної системи	+	
Харчова алергія	+	
Запалення, подразнення, сухість шкіри		+
Алергічний дерматит		+
Алергічні процеси верхніх дихальних шляхів		+
Порушення зору	+	
Підвищений ризик новоутворень		+

ризик розвитку злоякісних новоутворень у дихальних шляхах та легенях (див. табл. 3) (Ye J., Shi X., 2001; Спиваковский Ю.М., Спиваковская А.Ю., 2005).

Перспективи вивчення властивостей нанохрому

Останнім часом у різних галузях діяльності людини зростає інтерес науковців до нанотехнологій, зокрема наномедицини. Особлива увага приділяється пошуку природних наноструктур біометалів, які регулюють багато важливих біохімічних і фізіологічних функцій організму (Чекман І.С., Сімонов П.В., 2012). Перспективними структурами для застосування у наномедицині є наночастини металу хрому, що зумовило появу нових наукових публікацій. Дослідження впливу нанохрому в дозі 10 мкг/кг маси тіла у вагітних шурів показало підвищення вмісту загального білка та зниження активності амінотрансфераз у крові тварин, а в самців — збільшення кількості лейкоцитів, зниження вмісту гемоглобіну і насиченості трансферином (Іскра Р.Я., 2012а; б). Я.В. Лесик і співавтори (2010) вивчали вплив наноаквацитрату хрому (10 мкг/тварину/добу) та хлориду хрому (12,5 мкг/тварину/добу) у раціоні кролів, що відрізнялося підвищеним показником клітинного і гуморального імунітету тварин, а також в цілому імунобіологічної реактивності організму. Однак перспективи використання органічних сполук хрому у вигляді наночастинок, біологічна активність яких є значно вищою, ніж звичайних сполук, недостатньо з'ясовані.

Висновки

Аналіз даних літератури доводить, що Cr³⁺ відіграє важливу роль у вуглеводному, ліпідному та білковому обміні, а саме: допомагає підтримувати нормальні рівень глюкози у крові шляхом регуляції синтезу та активності інсуліну; впливає на концентрацію жирних кислот і холестерину в крові. Cr³⁺ надходить в організм із їжею. Нестача цього мікроелемента зумовлює пошушення метаболічних процесів, подібні до таких, що розвиваються при цукровому діабеті й серцево-судинних захворюваннях. Встановлено, що хром впливає на тривалість життя і процеси старіння, підвищує активність імунної системи. Розширення експериментальних досліджень сприятиме отриманню нових даних про роль сполук хрому в організмі людей і тварин, пошуку шляхів нормалізації мікроелементного балансу. Використання наночастинок хрому є перспективним науковим напрямком у теоретичній та практичній медицині.

Список використаної літератури

- Зубкова С.Т., Музь В.А. (2010) Зміни вмісту мікроелементів цинку, хрому і марганцю у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу. Ендокринологія, 15(1): 97–101.
- Іскра Р.Я. (2011а) Мікроелементи тканин внутрішніх органів шурів за дії хлориду і наночрату хрому. Мед. хімія, 13(3): 31–35.
- Іскра Р.Я. (2012а) Білковий обмін у вагітних шурів за дії цітрату нанохрому. Мед. хімія, 14(2): 69–71.

Іскра Р.Я. (2012б) Фізіологічно-біохімічні особливості метаболізму в самців і самок шурів за дії цітрату нанохрому. Клін. та експерим. патологія, 11(2): 49–51.

Іскра Р.Я., Влізло В.В. (2013) Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в еритроїдних клітинах тканинах свиній за дії хрому хлориду. Укр. біохім. журн., 85(3): 96–102.

Іскра Р.Я., Янович В.Г. (2011а) Біохімічні механізми дії хрому в організмі людини і тварин. Укр. біохім. журн., 83(5): 5–11.

Іскра Р.Я., Янович В.Г. (2011б) Інтенсивність пероксидних процесів і активність антиоксидантних ензимів у тканинах шурів за підвищеного рівня хрому в раціоні. Укр. біохім. журн., 83(3): 91–98.

Лесик Я.В., Федорук Р.С., Долайчук О.П. (2010) Глікопротеїни крові та показники неспеціфичної резистентності організму кролів за вилученням наноаквацитрату хрому та хлориду хрому. Наук. вісн. ЛНУ, 37: 82–86.

Маркевич В.Е., Глушенко Н.В. (2010) Особливості мікроелементного та енергетичного забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет. Вісн. Сум. держ. ун-ту, 1: 112–122.

Мерецький В., Шманько В. (2007) Сучасні погляди на роль мікроелементів у патогенезі цукрового діабету. Ліки України, 109: 32–35.

Нейко Е.М. (2008) Мікроелементи в медицині. Вклад вчених Івано-Франківського державного медичного університету. Галиц. лік. вісн., 15(2): 5–8.

Снітінський В.В., Сологуб Л.І., Антоняк Г.Л. та ін. (1999) Біологічна роль хрому в організмі людини і тварин. Укр. біохім. журн., 71(2): 5–10.

Спиваковский Ю.М., Спиваковская А.Ю. (2005) Мікроелементи и их роль в жизни человека. Мед. сестра, 5: 19–22.

Степанюк В.Д. (2001) Особливості та основні шляхи виведення хрому з організму. Гигієна труда, 32: 236–244.

Трахтенберг І.М., Чекман І.С., Линник В.О. та ін. (2013) Взаємодія мікроелементів: біологічний, медичний і соціальний аспекти. Вісн. НАН України, 6: 11–20.

Тронько М.Д., Щербак О.В. (2002) Мікроелементи в ендокринології. Аспекти фармакології, 10: 1–6.

Харченко О.О. (2012) Цітрати біометалів — як альтернатива вирішенню проблеми дефіциту макро-та мікроелементів. Гігієна населених місць, 60: 242–247.

Чекман І.С., Сімонов П.В. (2012) Природні наноструктури та наномеханізми. Задруга, Київ, 102 с.

Щербак О.О., Бірюкова Л.М., Кирієнко Д.В. (2002) Про доцільність застосування сполук хрому при лікуванні цукрового діабету. Фармац. журн., 4: 93–97.

Щербак О.О., Кирієнко Д.В., Бутілін В.Ю. та ін. (2004) Використання комплексних лікарських засобів з вмістом мікроелементів у лікуванні хворих на цукровий діабет. Фармац. журн., 1: 101–104.

Anderson R.A. (1998) Chromium, glucose intolerance and diabetes. J. Am. Coll. Nutr., 17(6): 548–555.

Cefalu W.T., Hu F.B. (2004) Role of chromium in human health and in diabetes. Diabetes Care, 27(11): 2741–2751.

Ekmekcioglu C. (2001) The role of trace elements for the health of elderly individuals. Nahrung., 45(5): 309–316.

Jeejeebhoy K.N. (1999) Chromium and parenteral nutrition. J. Trace Elem. Exp. Med., 12: 85–89.

Mahmoud A.A., Karam S.H., Abdel-Wahab M.A. (2006) Chromium-picoline induced ocular changes: Protective role of ascorbic acid. Toxicology, 226(2–3): 143–151.

Morris B.W. (1999) Chromium action and glucose homeostasis. J. Trace Elem. Exp. Med., 12: 61–70.

Pechova A., Pavlata L. (2007) Chromium as an essential nutrient: a review. Veterinarni Medicina, 52(1): 1–18.

Vincent J.B. (2000) The biochemistry of chromium. J. Nutr., 130(4): 715–718.

Vincent J.B. (2010) Chromium: celebrating 50 years as an essential element? Dalton Trans., 39(16): 3787–3794.

Ye J., Shi X. (2001) Gene expression profile in response to chromium-induced cell stress in A549 cells. Mol. Cell Biochem., 222(1–2): 189–197.

Хром и нанохром: свойства, возможности применения в медицинской практике

Е.В. Садогурская, В.Г. Каплуненко,
І.С. Чекман

Резюме. В обзорной статье приведены современные данные о микроэлементе хроме (Cr^{3+}), его природных источниках, физиологической роли в организме человека, метаболизме и экскреции. Хром является компонентом фактора толерантности к глюкозе — органического комплекса, вместе с инсулиномучаствующего в регуляции метаболизма углеводов путем оптимизации выделения инсулина и его связывания с соответствующими мембранными рецепторами. Приведены данные относительно норм потребления хрома и содержания его в продуктах питания, а также его использования при различных патологиях. Определены перспективы применения наночастиц хрома, биологическая активность которых значительно выше.

Ключевые слова: микроэлементы, хром, глюкоза, толерантность, инсулин, нанохром.

Chromium and nanochromium: properties, prospects of application in medical practice

K.V. Sadogurska, V.G. Kaplunenko,
I.S. Chekman

Summary. Modern data on a microelement of chromium (Cr^{3+}), its nature sources, physical role in a human organism, metabolism and excretion are presented in the overview article. Chromium is the constituent of the glucose tolerance factor — organic complex involved in regulating carbohydrate metabolism by insulin secretion and optimizing its binding with the relevant membrane receptors. Data on consumption rates and chromium sources in food products are presented, as well as its use in various pathologies. Further application of chromium nanoparticles whose biological activity is significantly higher is noted.

Key words: microelements, chromium, glucose, tolerance, insulin, nanochromium.

Адреса для листування:

Чекман Іван Сергійович
03057, Київ, просп. Перемоги, 34
Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця, кафедра
фармакології та клінічної фармакології
E-mail: chekman_ivan@yahoo.co.uk
Одержано 14.11.2013