

11 (68,8%) , - 7 (43,7%) 9 (56,3%) - 5 (31,3%) ,

(*Cynara scolymus*)

••

-

-

,

-

( )-

*Mycobacterium tuberculosis* complex.

-

,

,

-

-

*Mycobacterium avium/intracellulare* complex,

CD4+-

« » ( ).

,

,

.

,

.

,

,

.

,

,

,

,

.

.

,

4-5

-

/

,

,

-

.

,

,

-

,

,

,

,

,

,

S6.

30-50 %

,

-

,

Xpert MTB/Rif

Mycobacterium tuberculosis complex.

, , , , - .  
 , , , , .  
 . . . .  
 : -  
 , 5 114  
 ( - ).  
 21  
 , - , I-II III-IV  
 (7,9±2,5) % ( <0,001). - (36,8±4,5) (7,0±2,4) % (35,1±4,5)  
 , I-II -  
 0,17, III-IV - 0,33.  
 - 0,29 - 0,63. I-II 0,16, III-IV  
 - 0,32.  
 (3,4±0,6) ( 4 . 9 ). -  
 (61,9 %). (13 21) -  
 , 2,7 , -  
 III-IV -  
 , 61,9 % -  
 (46,1 %) -  
 (30,8 %) -  
 ( , ) -  
 23,1% -  
 (38,1 %). -