

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВІЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**



МАТЕРІАЛИ
100 – і
підсумкової наукової конференції
професорсько-викладацького персоналу
Вищого державного навчального закладу України
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
11, 13, 18 лютого 2019 року

(присвячена 75 - річчю БДМУ)

Чернівці – 2019

УДК 001:378.12(477.85)

ББК 72:74.58

М 34

Матеріали 100 – ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11, 13, 18 лютого 2019 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – 544 с. іл.

ББК 72:74.58

У збірнику представлені матеріали 100 – ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ (м.Чернівці, 11, 13, 18 лютого 2019 р.) із стилістикою та орфографією у авторській редакції. Публікації присвячені актуальним проблемам фундаментальної, теоретичної та клінічної медицини.

Загальна редакція: професор Бойчук Т.М., професор Іващук О.І., доцент Безрук В.В.

Наукові рецензенти:

професор Братенко М.К.
професор Булик Р.Є.
професор Гринчук Ф.В.
професор Давиденко І.С.
професор Дейнека С.Є.
професор Денисенко О.І.
професор Заморський І.І.
професор Колоскова О.К.
професор Коновчук В.М.
професор Пенішкевич Я.І.
професор Сидорчук Л.П.
професор Слободян О.М.
професор Ткачук С.С.
професор Тодоріко Л.Д.
професор Юзько О.М.
д.мед.н. Годованець О.І.

ISBN 978-966-697-543-3

© Буковинський державний медичний
університет, 2019



Berezova M.S.

**PECULIARITIES OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS
WITH CONCOMITANT OBESITY**

Department of Internal Medicine and Infection Diseases

Higher state educational establishment of Ukraine

«Bukovinian State Medical University»

Obesity is considered to be a risk factor for the development and progression of chronic kidney disease. According to the World Health Organization as of 2017 more than 2 billion adults are overweight, 670 million of them are obese (39% men and 40% women). The negative impact of overweight on renal function is still not understood well enough.

To study the features of the course of chronic kidney disease in patients with and without concomitant obesity.

The study involved 30 patients with stage 2 of chronic kidney disease (CKD), who were hospitalized in the Nephrology department of "Chernivtsi regional clinical hospital." The average age of the patients was 45.5 ± 2.5 years (from 41 to 52 years). CKD was caused by: chronic pyelonephritis in 17 patients (56,7%), diabetic nephropathy in 13 patients (43,3%). CKD duration ranged from 7 to 10 years (on average 8.9 ± 1.5 years).

All patients were divided into three groups. The first group consisted of patients with 2 stage CKD without concomitant obesity (11 persons), The second group included stage 1 obese patients with stage 2 CKD (9 persons), group 3 consisted of 10 patients with stage 2 CKD and stage 2 concomitant obesity. Body mass index (BMI) was calculated by the formula: BMI = body weight in kg / (height in meters²).

An analysis of renal function in the evaluation of patients with the second degree CKD and without concomitant obesity as compared with the healthy subjects showed the presence of proteinuria and deterioration of glomerular filtration rate ($p < 0.05$). However, in the groups of patients with obesity these figures as compared with the patients without concomitant obesity were reliably lower ($p < 0.05$) and were dependent on the degree of obesity.

The analysis of clinical and laboratory parameters revealed the presence of imbalance in fat metabolism in obese and non-obese patients with chronic kidney disease. However, the changes in patients with II degree obesity were more significant. In this same group the patients showed a more pronounced impairment of renal function, indicating a more severe course of disease in obese patients. It means that this variant of the disease is more unfavorable.

Білоюка Ю.В.

**ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КИШЕЧНИКУ
У ХВОРИХ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ**

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

В останні роки проблема розповсюдженості синдрому подразненої кишki (СПК) є однією з важливих проблем нашого сьогодення.

Мета дослідження було оцінити функціональний стан кишечнику у хворих на ожиріння.

Обстежено 60 осіб, з них до 1-ї групи увійшли хворі на ожиріння I-II ст. з підсиленням моторно-евакуаторної функції кишечнику ($n=15$), до 2-ї групи увійшли пацієнти з ожирінням та гіпомоторикою кишечнику ($n=14$), 3-ю групу склали хворі на ожиріння з нормальнюю моторно-евакуаторною функцією кишечнику ($n=16$). 4-у групу склали 15 практично здорових осіб. Оцінку моторно-евакуаторної функції кишечника проводили за допомогою фоносентерографії.

При оцінці функціонального стану кишечнику встановлено, що кількість перистальтичних хвиль у хворих 1-ї групи склала 4.34 ± 0.21 од./хв. і була вірогідно нижчою, ніж у практично здорових осіб (ПЗО). У хворих 2-ї групи виявлене високовірогідне зниження