

**EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE EFFICACY OF USING
INDIVIDUAL EVALUATION SYSTEMS FOR THE SEVERITY
OF SURGICAL PATIENTS CONDITION**

R.I.Sydorchuk

Abstract. The efficacy of using individual systems estimating the severity of the surgical patients' state (APACHE, APACHE II, MIP) has been studied in a comparative aspect by means of experimental modeling. The application of such systems with a prognostic purpose is advisable for using in clinical conditions. It is expedient to combine different evaluation systems with the aim of enhancing prognostic reliability and optimizing the treatment tactics.

Key words: surgery, diagnostics, APACHE, APACHE II, MIP, peritonitis.

Bukovinian State Medical Academy (Chernivtsi)

Надійшла до редакції 4.05.2001 року

УДК 616-092:547.2-084-019

K.M.Xlус

**ЗМІНИ ПРОВІДНИХ БІОХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ ГОМЕОСТАЗУ
ЯК РЕАКЦІЯ НА ІНГАЛЯЦІЙНУ ДІЮ ЩАВЛЕВОЇ КИСЛОТИ**

Кафедра медичної хімії (зав. – проф. I.Ф.Мешишен)
Буковинської державної медичної академії

Резюме. Мінливість біохімічних показників гомеостазу більшів шурів визначається чотирма спільними факторами. Інгаляційне надходження до організму щавлевої кислоти (концентрація $4,4 \pm 0,8 \text{ мг}/\text{м}^3$) викликає зміни варіабельності окремих показників.

Ключові слова: щавлева кислота, інгаляція, факторний аналіз.

Вступ. Внутрішньопопуляційна мінливість обумовлює диференційну чутливість особин до дії негативних факторів довкілля. Внаслідок цього в експериментах по встановленню параметрів токсичності ксенобіотиків із використанням малої кількості лабораторних тварин часто не виявляється вірогідна різниця між дослідними та контрольними групами. Водночас вважається, що за допомогою сучасних методів статистичного аналізу можна виявити приховані порушення та дискоординацію функцій організму [3]. Зокрема, факторний аналіз дозволяє: 1) замінити велику кількість змінних, що визначалися, на значно меншу кількість факторів, які обумовлюють більшу частку загальної дисперсії; 2) виявити та конкретизувати взаємозалежності між змінними; 3) створити гіпотезу щодо причинно-наслідкових зв'язків і механізмів дії [1]. У нашому дослідженні факторизація була застосована для визначення негативних ефектів щавлевої кислоти.

Мета дослідження. Визначити провідні фактори мінливості системи біохімічних показників гомеостазу та характер їх змін за інгаляційної дії щавлевої кислоти.

Матеріал і методи. Інгаляційне надходження щавлевої кислоти (концентрація $4,4 \pm 0,8 \text{ мг}/\text{м}^3$) до організму більшів шурів ($n=8$) моделювали у пилових камерах при динамічному режимі роботи (контрольну групу складали всім інтактних шурів). За відомими методами отримували препарати сечі (після водного навантаження) та плазму крові [4]. У плазмі визначали активність аспартатамінотрансферази (AcAT), вміст середньомолекулярних пептидів (СМП), сечовини й HS-вмісних сполук (HS-групи) [2, 4]. Після визначення в сечі та плазмі крові концентрацій креатиніну юонік калію розраховували екскреційну фракцію калію ($\text{EF}_{\text{K}^+}, \%$) та швидкість клубочкової фільтрації за ендогенним креатиніном (GFR, $\text{мл}/\text{хв}$) [4]. При оцінці вірогідності різниці середніх арифметичних і коефіцієнтів варіації (S_v) між контрольною та дослідною групами з використанням 1-критерію Стьюдента нульову гіпотезу відкидали при $p < 0,05$ [1]. За допомогою програми статистичної обробки NCSS 2000 здійснювали кореляцій-

ний аналіз і факторизацію кореляційних матриць із застосуванням ортогональної ротації за методом "варімакс" [1].

Результати дослідження та їх обговорення. Для реалізації мети дослідження було обрано шість біохімічних показників, які мають високу критеріальну значущість в оцінці негативної дії ксенобіотиків. Так, рівень сечовини є провідним параметром при виявленні уремії, вміст СМП свідчить про інтенсивність деградації біоструктур, концентрація HS-вмісних сполук вказує на резерви систем детоксикації, активність AcAT вважається універсальним індикатором лабілізації клітинних мембрани, а EF_{K+} і GFR диференційно віддзеркалюють стан іонорегуляції та очищення крові від токсичних речовин екзо- та ендогенного походження [2,3,4]. Для жодного показника не виявлено вірогідної різниці між дослідом і контролем (табл. 1), проте для сечовини та СМП встановлено достовірні зміни ступеня варіабельності. Усі вивчені показники підкорялися закону нормального розподілу, тому відповідну кореляційну матрицю можна вважати інформативною. Факторизація, отриманої для групи інтактних тварин 6-мірної кореляційної матриці, дозволила виявити в досліджуваному набору змінних високі рівні спільнот (вони відповідають дисперсіям, обумовленим наявністю спільних факторів), за виключенням рівня СМП (табл. 2). Встановлено існування чотирьох спільних факторів, яким належить 100% кумулятивної мінливості обраної сукупності показників. Умовно, за показниками, що максимальні корелюють з виділеними факторами, фактор I (табл. 2) можна назвати фактором порушення детоксикації (зворотна кореляція з рівнем HS-груп і GFR), II – фактором деструкції (прямо корелює з концентраціями сечовини та СМП), III – фактором іонорегуляції, IV – фактором резистентності біомембран.

Таблиця 1

Біохімічні показники гомеостазу в щурів контрольної та дослідної груп

Показник, одиниця вимірю	Контроль (n=8)		Дослід (n=8)	
	x±Sx	Cv±S _{Cv} , %	x±Sx	Cv±S _{Cv} , %
Сечовина, ммоль/л	4,84±0,427	24,98±3,49	4,96±0,20	11,28±2,58*
HS-групи, ммоль/л	0,368±0,019	14,45±4,26	0,353±0,009	7,23±1,51
СМП, од. оптич. густини	0,168±0,009	15,79±3,50	0,164±0,019	32,47±3,99*
AcAT, мкмоль/год/мл	4,58±0,258	15,92±4,30	4,04±0,194	13,58±3,79
EF _{K+} , %	0,488±0,058	33,68±9,45	0,513±0,0101	55,62±12,57
GFR, мл/хв	0,803±0,084	29,60±4,97	0,788±0,082	29,48±0,08

Примітка. * – різниця вірогідна (p <0,05)

Таблиця 2

Результати факторизації кореляційної матриці в контрольній групі тварин

Показник	Факторні навантаження				Спільність	Фактор	Власне значення	Власна частка, %	Кумулятивна частка, %
	I	II	III	IV					
Сечовина	0,170	0,898	0,279	0,178	0,95	I	1,74	34,44	34,44
HS-групи	-0,881	-0,293	0,268	0,265	1,00	II	1,31	25,96	60,39
СМП	0,283	0,441	0,078	0,192	0,32	III	1,17	23,07	83,46
AcAT	0,201	-0,349	0,277	-0,814	0,90	IV	0,85	16,86	100,32
EF _{K+}	-0,043	-0,291	-0,925	0,225	0,99	V	0,00	0,03	100,35
GFR	-0,902	-0,142	-0,283	0,029	0,92	VI	-0,02	-0,35	100,00

Примітка. Жирним шрифтом виділено факторні навантаження, які вносять найбільший внесок в інтерпретацію відповідних факторів

Аналіз факторної матриці, отриманої для групи дослідних тварин, дозволив виявити істотне збільшення спільнот для СМП (табл. 3). За однакової кількості спільних факторів (4), які також повністю визначають мінливість системи, між ними відбуваються важливі перегрупування. Зокрема, фактор порушення детоксикації об'єднується з фактором іонорегуляції в єдиний фактор, проте це не призводить до простої сумації їх часток у загальній мінливості. Навпаки, фактор деструкції розпа-

дається на два окремі зі зміною позитивного характеру його кореляційних взаємозалежностей – концентраціями сечовини та СМП на негативний, перетворюючись, таким чином, на фактори стабільноті біоструктур, що, безумовно, свідчить про їх підвищено значення за умов оксалатної інтоксикації (факторні навантаження двох нових чинників становлять 14,3% і 18,7% проти 23,0% для єдиного фактора деструкції в контрольній групі). Нарешті, на тісний зв'язок між функцією гломерулярно-фільтраційного апарату нирок та морфо-функціональним станом біомембрани вказує поява залежності фактора резистентності останніх від GFR (факторне навантаження 0,818), причому внесок даного чинника у загальну мінливість системи зростає з 16,8% до 31,4%.

Таблиця 3
Результати факторизації кореляційної матриці в дослідній групі тварин

Показник	Факторні навантаження				Спільність	Фактор	Власне значення	Власна частка, %	Кумулятивна частка, %
	I	II	III	IV					
Сечовина	-0,119	0,066	-0,847	-0,063	0,74	I	1,99	35,43	35,43
HS-групи	-0,951	0,231	-0,088	-0,149	0,99	II	1,77	31,42	66,86
СМП	-0,211	-0,054	-0,070	-0,939	0,93	III	0,80	14,31	81,16
AcAT	0,227	-0,966	0,021	0,089	0,99	IV	1,05	18,77	99,93
EF _{K+}	0,902	-0,319	0,139	0,171	0,96	V	0,02	0,34	100,27
GFR	-0,400	0,818	0,232	0,331	0,99	VI	-0,02	-0,27	100,00

Примітка. Жирним шрифтом виділено факторні навантаження, які вносять найбільший внесок в інтерпретацію відповідних факторів

Висновки.

1. Досліджувані біохімічні показники гомеостазу створюють єдину систему, мінливість якої визначають 4 спільні фактори, відповідальні за морфо-функціональний стан біомембрани, інтенсивність детоксикаційних, деструктивних та іонорегулювальних процесів.

2. Інгаляційне надходження щавлевої кислоти спричиняє варіабельність окремих змінних і їх перерозподіл між факторами.

3. За умов щавлевокислотної інтоксикації істотно збільшується значущість факторів резистентності біологічних мембрани та інтенсивності деградації біоструктур.

Література. 1. Афиши А., Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ. – М.: Мир, 1982. – 488 с. 2. Методы исследования в профпатологии (биохимические) / Архипова О.Г., Шацкая Н.Н., Семенова Л.С. и др. / Под ред. Архиповой О.Г. – М.: Медицина, 1988. – 208 с. 3. Проблемы нормы в токсикологии (современные представления и методические подходы, основные параметры и константы) / И.М. Трахтенберг, Р.Е. Сова, В.О. Шефтель, Ф.А. Онищенко / Под ред. И.М. Трахтенberга. – М.: Медицина, 1991. – 208 с. 4. Хлус К.Н. Биохимические механизмы токсического действия оксалатов // Укр. биохим. журн. – 1998. – Т. 70, № 3. – С. 95 – 102.

CHANGES OF THE PRINCIPAL BIOCHEMICAL FACTORS OF HOMEOSTASIS AS A RESPONSE TO THE INHALATION EFFECT OF THE OXALIC ACID

K.M.Khlus

Abstract. 4 common factors determine the variability of biochemical homeostatic indices of albino rats. The inhalation entrance of oxalic acid into the rat body (concentration 4,4±0,8 mg/m³) causes variability changes of certain indices.

Key words: oxalic acid, inhalation, factor analysis.

Bukovinian State Medical Academy (Chernivtsi)

Надійшла до редакції 3.03.2001 року