

УДК 616-053.1/.31-06:613.84

## РОЛЬ ТЮТЮНОКУРІННЯ ТА ІНШИХ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ ПЛОДА ТА НОВОНАРОДЖЕНОГО

Підвисоцька Н.І., Сорокман Т.В., Ластівка І.В., Гінгуляк М.Г.

Буковинський державний медичний університет,

м. Чернівці, Україна

Здоров'я дитини формується під комплексним впливом спадкової схильності та зовнішніх факторів, що постійно діють як фактори ризику і фактори захисту. Хронічна дія негативних чинників на жінку під час вагітності веде до виникнення в плода вроджених аномалій розвитку.

Нами проведений аналіз частоти тютюноподібного та вживання алкоголю у вагітних, які народили дитину з вадою розвитку. Вживання алкоголю і куріння матір'ю впродовж вагітності визначалося за результатами анкетування матерів. Об'єми і кратність вживання, характеристики алкоголю та тютюну не оцінювалися.

Шкідливі звички мали  $70,1 \pm 3,8\%$  батьків та  $50,7 \pm 4,2\%$  матерів дітей із вродженими вадами розвитку, у групі контролю, відповідно  $46,9 \pm 6,1\%$  і  $22,7 \pm 5,2\%$ ,  $p < 0,05$  для обох показників.  $30,6 \pm 3,8\%$  матерів та  $29,9 \pm 3,8\%$  батьків, які мають дитину із вродженою вадою розвитку, постійно вживали каву, що достовірно вище у порівнянні з контролем (відповідно  $13,6 \pm 4,2\%$  матерів і  $18,2 \pm 4,7\%$  батьків,  $p < 0,05$ ).

Жоден з батьків досліджуваних груп не вказав, що вживає наркотичні препарати або є токсикоманом. Відносна більшість обох батьків дітей із вродженою вадою розвитку курили ( $61,8 \pm 4,4\%$  батьків і  $22,2 \pm 3,5\%$  матерів) та вживали алкоголь до вагітності (матері – у  $56,9 \pm 4,1\%$  випадків, батьки – у  $98,6 \pm 0,9\%$ ). У контролі –  $87,9 \pm 4,0\%$  матерів та  $25,8 \pm 5,4\%$  батьків вказали, що не курять,  $31,8 \pm 5,7\%$  матерів і  $9,1 \pm 3,5\%$  взагалі не вживають алкоголю.

У нашому дослідженні  $26,4 \pm 3,7\%$  матерів дітей із вродженою вадою розвитку курили впродовж вагітності,  $10,4 \pm 2,5$  – вживали алкоголь (у групі контролю  $3,0 \pm 2,1\%$  і  $1,5 \pm 1,5\%$ , відповідно). З нашої точки зору, широта поширення даного фактора може бути тільки збільшена, причому в обох групах рівномірно.

І алкоголь, і тютюн, які вживаються матір'ю підвищують ризик виникнення вродженої вади ( $OR=18,2$  і  $OR=7,6$ ). Щодо батька, то найсильніші асоціації відмічені між поєднаним курінням і вживанням алкоголю батьком до зачаття та вродженою вадою в дитини ( $OR=2,9$  при ДІ 1,7-5,3). Наявність у родині хоча б одної людини, що курить створює умови для постійної експозиції дитини внутрішньоутробно.

У цілому, під впливом шкідливих звичок подружжя ймовірність виникнення патології в новонародженої дитини підвищувалася: для матері  $OR=3,5$  при ДІ 1,8-6,3; для батька  $OR=2,6$  при ДІ 1,6-4,7.