

**ВПЛИВ ПАСИВНОГО ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ФІЗИЧНИЙ
ТА НЕРВОВО-ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ РАНЬОГО
ВІКУ**

Безрук В.В.

*Буковинський державний медичний університет,
м. Чернівці, Україна*

Захворюваність дітей є одним із важливих критеріїв стану здоров'я населення. Нажаль, слід констатувати зростання захворюваності серед дитячого населення в нашій державі. Наявність найбільш поширеної шкідливої звички – тютюнопаління батьків негативно впливає на здоров'я дитини.

Під спостереженням перебувало 187 дітей перших трьох років життя. Кількість обстежених дітей склала 5% від загальної кількості дітей грудного та раннього віку м. Чернівці. Це є достатнім для розцінювання обстеженої вибірки, як репрезентативної до всієї популяції.

Пасивне паління є одним із чинників, що призводять до відставання у фізичному розвитку дитини (Тимченко О.І., Подольський В.В., 2002). У нашому дослідженні ми отримали результати, що підтверджують ці дані. Згідно анкетування за наявність дії чинника вважали ситуацію, коли хтось із членів сім'ї палив у присутності дітей у житлових приміщеннях. Пасивне паління дітей, ймовірно, негативно впливало на зросто-масові показники (негативний кореляційний зв'язок з масою тіла – $r=-0,32$, $p<0,05$ та зростом – $r=-0,31$, $p<0,05$) і могло бути одним із низки чинників, що зумовлювали диспропорційність розвитку дитини ($r=-0,30$, $p<0,05$).

Паління батьком могло також бути причиною порушень нервово-психічного розвитку дитини (затримка термінів оволодіння статичними навичками дитиною (вміння самостійно стояти) – $r=-0,42$, $p<0,05$).

Враховуючи результати кореляційного аналізу можна говорити про те, що тютюнопаління батьків слід віднести до когорти факторів ризику, які можуть негативно позначитися як на фізичному так і нервово-психічному розвитку дитини.