


579
Р64

Міністерство охорони здоров'я України
Буковинська державна медична академія

РОЗВИТОК САНІТАРНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
наукової конференції,
присвяченої 100-річчю з дня
народження професора
КАЛИНИ Георгія Платоновича
м. Чернівці, 17 травня 2002 року



м. Чернівці
2002

ЗАСТОСУВАННЯ ЛАВРУ БЛАГОРОДНОГО В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ

О.І. Волошин, О.І. Славський

Буковинська державна медична академія, м. Чернівці

Нами вивчений стан гепатобіліарної (ГБС) і гастродуоденальної (ГДС) систем та визначена кількість колоній у мазках із зіву у 42 хворих на ХОБ і проведена спроба їх корекції за допомогою застосування настоянки ЛБ у комплексній терапії.

Застосування 10 % настоянки ЛБ в дозі по 25 крапель 4 рази на добу протягом 10-14 днів сприяло підвищенню секреції шлункового соку, нормалізації тонуусу жовчного міхура при гіпертонічній дискінезії. Однак, при гіпотонічній дискінезії жовчного міхура, зазначений фітопрепарат призводив до збільшення атонії жовчного міхура.

Також встановлено позитивний вплив досліджуваного фітопрепарату на функціональний стан бронхо-легеневої системи: покращувались показники функції зовнішнього дихання, форсована житева ємкість легень (ФЖЕЛ), об'єм форсованого видиху (ОФВ), індекс Тіффно-Вотчала, максимальна вентиляція легень (МВЛ), зменшувалась кількість харкотиння у шести хворих, а у решти пацієнтів припинилося виділення харкотиння. Також зменшувалась кількість колоній у мазках із зіву хворих, прискорився регрес клінічних проявів ХОБ: зменшились задишка, кашель, зникли хрипи у 32 хворих, покращились показники якості життя.

Отже настоянку ЛБ можна пропонувати як додатковий засіб для комплексного лікування хворих на ХОБ, особливо в ситуаціях з наявністю в них супутніх хронічних гастритів і холециститів.