

**МІНІСТЕРСТВО
ВІШІЙ ДЕРЖАВНИЙ ПУНКТУАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
HIGHER STATE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF UKRAINE
"BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY"**

Індексований у міжнародних наукометрических базах:

Academy (Google Scholar)
Ukrainian Research&Academy Network
(URAN)
Academic Resource Index Research Bib

Index Copernicus International
Scientific Indexing Services
Включений до Ulrichsweb™ Global Serials
Directory

**KLINICHNA TA
EKSPERIMENTAL'NA
PATOLOGIYA**

**CLINICAL & EXPERIMENTAL
PATHOLOGY**

На всі статті, опубліковані в журналі «Клінічна та експериментальна патологія»,
встановлюються цифрові ідентифікатори DOI

Т. XVII, № 1 (63), 2018

**Щоквартальний український
науково- медичний журнал.
Заснований у квітні 2002 року**

**Свідоцтво про державну реєстрацію
— Серія КВ №6032 від 05.04.2002 р.**

Засновник і видавець: Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Головний редактор
В. Ф. Мислицький

Редакційна колегія:

Булик Р.Є.
Власик Л. І.
Денисенко О. І.
Іващук О. І.
Ілащук Т.О.
Колоскова О. К.
Коновчук В. М.
Масікевич Ю. Г.
Пашковський В. М.
Плеш I.A.
Полянський I. Ю.
Сорокман Т. В.
Федів О. І.

Перший заступник головного редактора
С. С. Ткачук

Відповідальні секретарі:
С. Є. Дейнека
О. С. Хухліна

Секретар
Г. М. Лапа

Наукові редактори випуску:
д. мед. н., проф. Т. О. Ілащук
д. мед. н., проф. Ю. Г. Масікевич
д. мед. н., проф. Т. В. Сорокман

Адреса редакції: 58002, Чернівці, пл. Театральна, 2, видавничий відділ БДМУ.
Тел./факс: (0372) 553754. **E-mail** myslytsky@gmail.com yfmyslickij@bsmu.edu.ua
Повнотекстова версія журналу представлена на сайті <http://www.bsmu.edu.ua/files/KEP/>
Електронні копії опублікованих статей передаються до **Національної бібліотеки**
ім. В.В.Вернадського для вільного доступу в режимі on-line.
Реферати статей публікуються в "**Українському реферативному журналі**", серія
"Медицина"

**Бібліотека
БДМУ**

Редакційна рада:

проф. А.В. Абрамов (Запоріжжя, Україна); акад. РАН, проф. І.Г. Акмаєв (Москва, Російська Федерація); проф. Е.М. Алієва (Баку, Азербайджан); проф. А.І. Березнякова (Харків, Україна); проф. В.В. Братусь (Київ, Україна); проф. Т.М. Досаев (Алмати, Республіка Казахстан); чл.-кор. НАН України, проф. В.М. Єльський (Донецьк, Україна); проф. І.М. Катеренюк (Кишинів, Республіка Молдова); проф. Ю.М. Колесник (Запоріжжя, Україна); акад. АН ВШ України, проф. С.С. Костишин; проф. М. В. Кришталь (Київ, Україна); чл.-кор. АМН України, проф. В.А.Міхньов (Київ, Україна); чл.-кор. НАМН України, проф. М.Г. Проданчук; акад. АМН, чл.-кор. НАН України, О.Г. Резніков (Київ, Україна); чл.-кор. НАН України, проф. В.Ф. Сагач (Київ, Україна); чл.-кор. НАН України, проф. Р.С. Стойка (Львів, Україна); акад. НАМН, чл.-кор. НАН України М.Д. Тронько; проф. В. В. Чоп'як (Львів, Україна); проф. В.О. Шидловський (Тернопіль, Україна); проф. Шумаков В. О. (Київ, Україна).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 р., № 1279 журнал "Клінічна та експериментальна патологія" включено до переліку наукових фахових видань України

Рекомендовано до друку та поширення через Інтернет рішенням вченого ради вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет (протокол № 6 від 22.02.2018 р.)

Матеріали друкуються українською, російською та англійською мовами

Комп'ютерний набір і верстка -
М.П. Мотрук
Наукове редактування - редакції

Рукописи рецензуються. Редколегія залишає за собою право редактування.

Редактування англійського тексту - Г. М. Лапи

Передruk можливий за письмової згоди редколегії.

Коректор - І.В. Зінченко

Група технічно- інформаційного забезпечення:
І.Б. Горбатюк
Л.І. Сидорчук,
В.Д. Сорохан

ISSN 1727-4338

DOI 10.24061/1727-4338.XVII.1.63.2018

© "Клінічна та експериментальна патологія" (Клін. та експерим. патол.), 2018

© Clinical and experimental pathology (Clin. and experim. pathol), 2018
Founded in 2002
Publishing four issues a year

© "Клиническая и
экспериментальная патология"
(Клин. и эксперим.патол.), 2018

ЛАЗЕРНА НЕФЕЛОМЕТРІЯ БІОТКАНИН

Д.І.Остafiйчuk, А.Б.Горкуненко*, Т.О.Плаксива, Н.А.Скринська

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет", м.Чернівці
*ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського МОЗ України", м.Тернопіль

Клінічна та
експериментальна
патологія Т.17, №1
(63). С.127-131.

DOI:10.24061/1727-
4338.XVII.1.63.2018.90

E-mail:
ostafiiichukdmytro
@gmail.com

Резюме. У даній статті оглядово проаналізовано можливості використання методу лазерної нефелометрії (Мюллер-матричної поляризації) у діагностиці структури архітектоніки біотканин, обґрунтовано використання поляризаційних методів дослідження в медицині, що дають нову інформацію про морфологічну й оптико-анізотропну структуру біотканин.

Ключові слова: лазери, діагностика, поляриметрія, нефелометрія, матриця Мюллера, біотканина.

Клиническая и
экспериментальная
патология Т.17, №1
(63). С.127-131.

ЛАЗЕРНАЯ НЕФЕЛОМЕТРИЯ БИОТКАНИ

Д.І.Остafiйчuk, А.Б.Горкуненко, Т.О.Плаксива, Н.А.Скринская

Резюме. В данной статье ознакомительно проанализировано возможности использования метода лазерной нефелометрии (Мюллера-матричной поляризации) в диагностике структуры архитектоники биоткани, обосновано использование поляризационных методов исследования в медицине, которые дают новую информацию о морфологической и оптически - анизотропной структуре биоткани.

Ключевые слова: лазеры, диагностика, поляриметрия, нефелометрия, матрица Мюллера, биоткань.

Clinical and
experimental
pathology. Vol.17,
№1 (63). P.127-131.

LASER NEPHELOMETRY OF BIOTISSUE

D.I.Ostafiiichuk, A.B. Horkunenko, T.O. Plaksivaya, N.A. Skrynskaya

Abstract. The possibility of using the laser nephelometry (Mueller-matrix polarization) method in the diagnostics of the biotissue architectonics structure is analyzed in this article. The use of polarization methods of research in medicine which provide new information on the morphological and optically anisotropic structure of the tissue is substantiated.

Key words: lasers, diagnostics, polarimetry, nephelometry, Mueller matrix, biotissue.

Вступ

За останній час у медичній діагностиці набули широкого застосування оптичні методи формування пошарових зображень біологічних тканин. Основою одержання такої інформації є метод оптичної когерентної томографії [1,2]. Основою методу є використання низькокогерентної інтерферометрії для отримання внутрішніх зображень (координатних розподілів інтенсивності) біотканин на заданій глибині [3,4].

Новим напрямком медичної діагностики стає поляризаційно чутлива оптична когерентна томографія, яка забезпечує високу просторову роздільність інформації про стан поляризації відбитого випромінювання. Результатом використання даного методу є можливість створення поляризаційних мап зображень біооб'єкта на різних глибинах, розраховуючи відповідні матриці Мюллера (Мюллер-матричні зображення) для даного зразка [5,6].

Вимірювання Стокс-вектора світла, розсіяного на біотканині, розрахунок матриць Мюллера дає можливість отримати більш детальну інформацію про поляризаційні властивості біотканини [7].

На даний час інтенсивно розвиваються засоби оп-

тичної діагностики, які засновані на використанні монохроматичного когерентного лазерного випромінювання. Зумовлено це низкою причин:

- інформація, яка отримується в процесі досліджень, багатофакторна, що міститься в спектральних, поляризаційних, кореляційних і фотометрических характеристиках світлового поля, перетвореного біооб'єктом;
- висока чутливість і точність оптичних методик;
- оптична діагностика дистанційна і неруйнівна;
- біологічна тканина (дерма шкіри, м'язова тканина), як об'єкт дослідження, моделюється плоско паралельним шаром з однотипними оптичними властивостями, а їх поляризаційні властивості моделюються сукупністю фібрill, які утворюють архітектонічну сітку [8].

Основна частина

МЕТОДИ ОПТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ БІООБ'ЄКТИВ

Всі методи діагностики можливо поділити на два напрямки: мікродіагностика (на рівні атомів, молекул) та макродіагностика (на рівні клітин, органів). Основою мікродіагностики є використання методів лінійної і не-лінійної атомної і молекулярної лазерної спектроскопії.

Основою макродіагностики є методи пружного та квазіпружного розсіювання світла, інтерферометрія, дифрактометрія. Використання в макродіагностиці монохроматичного та когерентного лазерного випромінювання, забезпечує високоточні вимірювання положення, швидкості, переміщення і форми різноманітних компонентів біооб'єктів [9,10]. Застосування лазерів в медицині, які володіють малою кутовою розбіжністю, високою спектральною густинорою, керованою поляризацією випромінювання, дозволило спростити вимірювання і підвищити їх надійність, розширити сферу застосування в гематології, імунології, вірусології.

Пружне розсіювання світла (лазерна нефелометрія) - один з ефективних методів макродіагностики. Даний метод застосовується для визначення ступення деформованості еритроцитів при накладанні до них напруг зсуву, вмісту білків у сечі та крові, функції розподілу еритроцитів по розмірах [9,11,12,13].

Об'єктом оптичних досліджень є фазово неоднорідні шари, які можна поділити на поверхнево-розсіюючі органічного та неорганічного походження та об'ємно-розсіюючі. Для дослідження структури таких об'єктів використовують спектрофотометричні, поляриметричні і кореляційні методи досліджень.

У результаті використання таких методів отримується інформація про фазово неоднорідні шари у вигляді спектральних розподілів інтенсивностей, поляризацій (азимутів та еліптичностей світлових коливань) та фаз їх об'єктних полів. Вимірюваними параметрами є сукупність статистичних амплітудно-фазових моментів об'єктного поля, автокореляційних функцій та спектрів потужностей [8]. Правда об'єктами таких досліджень є поверхнево розсіюючі шари, але переважно неорганічного походження.

Проте на даний час відома значна кількість праць з аналізу процесів світlorозсіювання фазово неоднорідними поверхнями біологічного походження (шорсткі поверхні шкіри, інших біологічних тканин). Основою таких напрямків досліджень є дослідження амплітудно-фазових статистичних моментів об'єктного поля та поляризаційних статистичних моментів, які характеризують розподілі азимутів і еліптичностей поляризації світлових коливань [14].

Поряд із статистичними підходами в оптичній діагностиці структури фазово неоднорідних шарів використовуються і методи фрактального аналізу (фрактальні поверхні мають властивості самоподібності та тонку структуру в малих масштабах) [15,16]. Самостійний інтерес являють дослідження фрактальних властивостей полів, розсіяних шорсткими поверхнями біологічних об'єктів [17,18]. Необхідно відмітити, що фрактали описують багато фізичних і природних явищ (росту, агрегації, кристалізації фазово неоднорідних речовин, які приводять до формування самоподібних структур). У якості таких об'єктів можуть бути об'ємно розсіюючі біологічні тканини [19].

Особливістю морфологічного формування біологічних тканин усіх типів є процеси необмеженого росту. У результаті росту утворюється структурована двокомпонентна структура, яка складається з побудованої

фібрілярної (ниткоподібної) позаклітинної матриці, що містить різного роду клітинні утворення. За вказаним принципом біотканини поділяють на групи: сполучна тканина (хрящі, сухожилля, шкіра, кров, лімфа); епітеліальна тканина (покриваючі клітини для легень, кишківника, кровоносних судин т.ін.), м'язова тканина (структурена система сукупності протеїнових пучків, створених оптично ізотропним актином і анізотропним міозином). Позаклітинна матриця всіх типів біотканин утворена ниткоподібними протеїновими ієрархічно побудованими фібрillами (колагени, міозин, еластин). Геометрична структура фібрill дискретна і самоподібна. Отже, морфологічна структура даних біооб'єктів, володіє самоподібною, а можливо і фрактальною геометрією (дослідження фрактальної структури сітки трабекул і остеонів, що формують кісткову тканину) [20,21,22].

Просторово-кутова геометрія архітектоніки біотканин різних типів подібна до оптично одноосних рідких кристалів. Такий підхід використовують для статистичного моделювання оптичних властивостей структурованих біологічних тканин.

Біотканину розглядають як модель аморфно-кристалічної матриці. Аморфна компонента біологічної тканини (жири, ліпіди, неструктуровані білки) поляризаційно ізотропна, тобто, оптично неактивна. Кристалічна компонента біотканини утворена просторово зорієнтованими двопроменезаломлюючими протеїновими фібрillами (колагенові білки, міозин). Властивості кожної окремої фібрilli моделюються оптично-одноосним кристалом, напрямок осі якого збігається з напрямком укладання в площині біотканини, а показник двопроменезаломлення визначається її речовою. Аналітичний опис процесів світlorозсіювання біотканин різних типів здійснюється на основі застосування матриці Мюллера для оптично одноосних структур [14,23-27].

У рамках такої моделі вдалося:

- пояснити механізми формування поляризаційної неоднорідності об'єктних полів біологічних тканин різних типів;
- встановлено зв'язки між величинами азимутів, еліптичностей поляризації світлових коливань об'єктного поля і напрямком укладання фібрill та їх анізотропією [28-32,];
- розроблено метод візуалізації архітектонічної структури біологічної тканини;
- впроваджено статистичний аналіз координатних розподілів поляризаційних параметрів полів розсіяного випромінювання;
- досліджено взаємозв'язок дисперсії азимутів і еліптичностей поляризації об'єктних полів фізіологічно нормальніх і патологічно змінених біологічних тканин;
- запропоновано критерії статистичної поляризаційної диференціації фізіологічних станів структурованих біологічних тканин [33-36].

Отже, складено новий напрямок оптичної діагностики біотканини, в основі якої лежить лазерна поляризометрія розподілів азимутів та еліптичностей поляризації світлових коливань в граничному об'єктному полі або

зображені біотканини [33-37]. Доповненням до даного напрямку є метод поляризаційної нефелометрії (з використанням матриці Мюллера, яка несе найбільш повну інформацію про поляризаційні властивості біологічних об'єктів).

Елементи матриці розсіювання світла (матриці Мюллера) залежать від довжини хвилі, кута розсіювання, геометричних і оптических параметрів розсіювачів. Вимірювання кутових залежностей елементів матриці Мюллера для кристаліка ока людини, які були проведенні за допомогою лазерного поляризаційного нефелометра, показали суттєву відмінність для нормальних та катарактальних кристаліків і ці розбіжності зумовлені появою великих несферичних розсіювачів часток в середовищі каламутного кристаліка за рахунок формування конгломератів високомолекулярних білків [38].

Дослідження склоподібного тіла показали, що ця біотканина, аморфної структури, не змінює поляризаційних характеристик світла, але деякі патології (невеликі внутрішні крововиливи) легко фіксуються за рахунок сильного розсіювання на еритроцитах, що призводить до змін елементів матриці розсіювання світла [39].

Висновки

Отже, у рамках оптико-кристалічної моделі побудови біологічної тканини [40] обґрунтована залежність кутових розподілів індикаторів елементів матриці Мюллера біотканини від оптических параметрів їх архітектонічної сітки, установлено взаємозв'язок між розподілами орієнтацій та величини двопроменезаломлення речовини біотканини і відносними значеннями елементів матриці Мюллера [39,41,42,43]. На основі цього розроблений метод стоксополяриметричної диференціації виникнення патологічних змін архітектоніки структуроуваних біологічних тканин, одержана нова інформація про структуру біологічної тканини у вигляді фазових та орієнтаційних томограм їх архітектоніки [44,45].

Список літератури

1. Тучин ВВ. Лазери и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях. 2-е изд. Москва: Физматлит; 2010. 478 с.
2. Tuchin VV, editors. Handbook of Coherent-domain Optical Methods: Biomedical Diagnostics, Environmental and Material Science. Vol. 1. 2nd ed. Springer; 2013.
3. Fercher AF. Optical coherence tomography. J Biomed Opt. 1996;1(2):157-73. doi: 10.1117/12.231361
4. Schmitt JM. Optical coherence tomography (OCT): a review. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 1999;5(4):1205-15. doi: 10.1109/2944.796348
5. de Boer JF, Milner TE, van Gemert MJ, Nelson JS. Two-dimensional birefringence imaging in biological tissue by polarization-sensitive optical coherence tomography. Opt Lett. 1997;22(12):934-6.
6. Jiao S, Yao G, Wang LV. Depth-resolved two-dimensional Stokes vectors of backscattered light and Mueller matrices of biological tissue measured with optical coherence tomography. Appl Opt. 2000;39(34):6318-24. doi: <https://doi.org/10.1364/AO.39.006318>
7. van de Hulst HC. Light scattering by small particles. 2th ed. New York: Dover Publications; 1981. 470 p.
8. Ушенко ОГ, Бачинський ВТ. Лазерна нефелометрія біологічних тканин: монографія. Чернівці: Рута; 2007. 300 с.
9. Приезжев АВ, Тучин ВВ, Шубочкин ЛП. Лазерная диагностика в биологии и медицине. Москва: Наука; 1989. 240 с.
10. Letokhov VS. Laser biology and medicine. Nature. 1985;316(6026):325-30.
11. Фрешні РЯ. Культура животных. Клінічна та експериментальна патологія. 2018. Т.17, №1 (63) клеток. Методы. Москва: Мир; 1989. 318 с.
12. Tuchin VV, editors. Cell and Biotissue Optics: Application in Laser Diagnostics and Therapy. Proc SPIE. 1994;2100.
13. Tertappen LW, de Groot BG, Visscher K, van Kouterik FA, Greve J. Four-parameter white blood cell differential counting based on light scattering measurement. Cytometry. 1988;9(1):39-43. doi: 10.1002/cyto.990090107
14. Ушенко АГ. Лазерная диагностика биофракталов. Квантовая электроника. 1999;29(3):239-45.
15. Mandelbrot BB. The Fractal Geometry of Nature. San Francisco: WH Freeman; 1982. 468 p.
16. Sayles R, Thomas TR. Surface topography as a nonstationary random process. Nature. 1978;271:431-4. doi: 10.1038/271431a0
17. Зимняков ДА. Эволюция фрактальной размерности флуктуаций интенсивности в зоне дифракции Френеля. Оптика и спектроскопия. 1997;83(5):795-800.
18. Zimnyakov DA, Tuchin VV. Fractality of speckle intensity fluctuations. Appl Opt. 1996;35(22):3325-33.
19. Pietronero L, Tosati E, editors. Fractals in Physics. Amsterdam; 1996. 422 p.
20. Brown JH, West GB, editors. Scaling in biology (Santa Fe Institute Studies on the Sciences of Complexity). 1st ed. Oxford University Press; 2000. 352 p.
21. Fernandez E, Jelinek HF. Use of fractal theory in neuroscience: methods, advantages and potential problems. Methods. 2001;24(4):309-21. doi: 10.1006/meth.2001.1201
22. Cowin SC. How is a tissue built? J Biomed Eng. 2000;122(6):553-68.
23. Пішак ВП, Ушенко ОГ, редактори. Лазерна поляриметрична діагностика в біології та медицині. Чернівці: Медакадемія; 2000. 305 с.
24. Ушенко АГ, Ангельський ОВ, Архелюк АД, Ермоленко СБ, Бурковець ДН. Рассеяние лазерного излучения мультифрактальными биоструктурами. Оптика и спектроскопия. 2000;88(3):495-8.
25. Ушенко АГ. Поляризационная структура биоспеклов и деполяризация лазерного излучения. Оптика и спектроскопия. 2000;88(4):651-4.
26. Gerrard A, Burch JM. Introduction to matrix methods in optics. New York: Dover Publications, Inc; 1975.
27. Ushenko AG. Stokes Correlometry of Biotissues. Laser Physics. 2000;10(6):1286.
28. Пішак ВП, Ушенко ОГ, Пішак ОВ. Дослідження мікроструктури кісткової тканини у поляризованому лазерному світлі. Медичні перспективи. 2000;5(4):3-7.
29. Пішак ВП, Ушенко ОГ, Пішак ОВ. Дослідження динаміки патологічних змін дисперсії та контрасту когерентних зображень кісткової тканини. Український медичний альманах. 2000;3(4):170-3.
30. Ushenko AG. Laser polarization microscopy of biofractals. Proc SPIE. 1998;3573:609-12.
31. Ushenko AG, Burkovets DM, Yermolenko SB, Arkhelyuk AD, Pishak VP, Pishak OV, et al. Laser polarimetry of the orientational structure of bone tissue osteons. Proc SPIE. 1999;3904:557-61.
32. Ushenko AG, Burkovets DM, Yermolenko SB, Arkhelyuk AD, Ushenko YA, Pishak VP, et al. Polarized microstructure of laser radiation scattered by optically active biotissues. Proc SPIE. 1999;3904:542-8.
33. Ushenko AG. Laser polarimetry of polarization-phase statistical moments of the objects field of optically anisotropic scattering layers. Optics and Spectroscopy. 2001;91(2):313-6.
34. Angel'skiy OV, Ushenko AG, Burkovets DN, Ushenko YuA. Polarization-correlation analysis of anisotropic structures in bone tissue for the diagnostics of pathological changes. Optics and Spectroscopy. 2001;90(3):458-62.
35. Ushenko AG. Laser probing of biological tissues and the polarization selection of their images. Optics and Spectroscopy. 2001;91(6):932-6.
36. Ushenko AG. Polarization contrast enhancement of images of biological tissues under the conditions of multiple scattering. Optics and Spectroscopy. 2001;91(6):937-40.
37. Yermolenko SB, Angelsky OV, Ushenko AG, Pishak VP, Pishak OV. Laser polarimetry tomography of biotissue pathological

- changes. Proc SPIE. 2001;4425:117-23.
38. Tuchin VV, Maksimova II, Zimnyakov DA, Kon IL, Mavlyutov AH, Mishin AA. Light propagation in tissues with controlled optical properties. J Biomed Opt. 1997;2(4):401-17. doi: 10.1117/12.281502
39. Jyzwicki R, Patorski K, Angelsky OV, Ushenko AG, Burkovets DN, Ushenko YA. Automatic polarimetric system for early medical diagnosis by biotissue testing. Optica Applicata. 2002;32(4):603-12.
40. Ангельський ОВ, Ушенко АГ, Архелюк АД, Ермоленко СБ, Бурковец ДН. О структуре матриц преобразования лазерного излучения биофракталами. Квантовая электроника. 1999; 29(3):235-8.
41. Ushenko AG. Polarization intrometry of phase-inhomogeneous layers. Proc SPIE. 2002;4900:1323-6.
42. Angelsky OV, Ushenko AG, Burkovets DN, Pishak VP, Pishak OV. Laser polarimetry of pathological changes in biotissues. Proc SPIE. 2002;4900:1045-9.
43. Ushenko AG, Pishak VP, Pishak OV, Olar OI, Yermolenko SB, Prydij AG, et al. Mueller matrices mapping of biological tissue architectures. Proc SPIE. 2004;5477:422-9.
44. Ushenko AG. 2D phase tomography of biotissues: I. Topological structure value of birefringence. Proc SPIE. 2004; 5477:438-9.
45. Ushenko AG. 2D phase tomography of biotissues: II. Polarization visualization and selection of biotissue image two-layer scattering medium. Proc SPIE. 2004;5477:450-6.
- References**
1. Tuchin VV. Lazery i volokonnaja optika v biomedicinskih issledovaniyah [Lasers and fiber optics in biomedical research]. 2-e izd. Moskov: Fizmatlit; 2010. 478 s. (in Russian).
 2. Tuchin VV, editors. Handbook of Coherent-domain Optical Methods: Biomedical Diagnostics, Environmental and Material Science. Vol. 1. 2nd ed. Springer; 2013.
 3. Fercher AF. Optical coherence tomography. J Biomed Opt. 1996;1(2):157-73. doi: 10.1117/12.231361
 4. Schmitt JM. Optical coherence tomography (OCT): a review. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 1999;5(4):1205-15. doi: 10.1109/2944.796348
 5. de Boer JF, Milner TE, van Gemert MJ, Nelson JS. Two-dimensional birefringence imaging in biological tissue by polarization-sensitive optical coherence tomography. Opt Lett. 1997;22(12):934-6.
 6. Jiao S, Yao G, Wang LV. Depth-resolved two-dimensional stokes vectors of backscattered light and mueller matrices of biological tissue measured with optical coherence tomography. Appl Opt. 2000;39(34):6318-24. doi: <https://doi.org/10.1364/AO.39.006318>
 7. van de Hulst HC. Light scattering by small particles. 2th ed. New York: Dover Publications; 1981. 470 p.
 8. Ushenko OH, Bachyn's'kyi VT. Lazerna nefelometriia biolohichnykh tkanyi [Laser nephelometry of biological tissues]: monohrafia. Chernivtsi: Ruta; 2007. 300 s. (in Ukrainian).
 9. Priezzhev AV, Tuchin VV, Shubochkin LP. Lazernaja diagnostika v biologii i medicine [Laser diagnostics in biology and medicine]. Moskov: Nauka; 1989. 240 s. (in Russian).
 10. Letokhov VS. Laser biology and medicine. Nature. 1985;316(6026):325-30.
 11. Freshni PJ. Kul'tura zhivotnyh kletok. Metody [Culture of animal cells. Methods]. Moskov: Mir; 1989. 318 s. (in Russian).
 12. Tuchin VV, editors. Cell and Biotissue Optics: Application in Laser Diagnostics and Therapy. Proc SPIE. 1994;2100.
 13. Tertappen LW, de Groot BG, Visscher K, van Kouterik FA, Greve J. Four-parameter white blood cell differential counting based on light scattering measurement. Cytometry. 1988;9(1):39-43. doi: 10.1002/cyto.990090107
 14. Ushenko AG. Lazernaja diagnostika biofraktalov [Laser diagnostics of biofractals]. Kvantovaja elektronika. 1999; 29(3):239-45. (in Russian).
 15. Mandelbrot BB. The Fractal Geometry of Nature. San Francisko: WH Freeman; 1982. 468 p.
 16. Sayles R, Thomas TR. Surface topography as a nonstationary random process. Nature. 1978;271:431-4. doi: 10.1038/271431a0
 17. Zimnjakov DA. Jevoljucija fraktal'noj razmernosti fluktuacij intensivnosti v zone difrakcii Frenelja [Evolution of the fractal dimension of intensity fluctuations in the Fresnel diffraction zone]. Optika i spektroskopija. 1997;83(5):795-800. (in Russian).
 18. Zimnyakov DA, Tuchin VV. Fractality of speckle intensity fluctuations. Appl Opt. 1996;35(22):3325-33.
 19. Pietronero L, Tosati E, editors. Fractals in Physics. Amsterdam; 1996. 422 p.
 20. Brown JH, West GB, editors. Scaling in biology (Santa Fe Institute Studies on the Sciences of Complexity). 1st ed. Oxford University Press; 2000. 352 p.
 21. Fernandez E, Jelinek HF. Use of fractal theory in neuroscience: methods, advantages and potential problems. Methods. 2001;24(4):309-21. doi: 10.1006/meth.2001.1201
 22. Cowin SC. How is a tissue built? J Biomed Eng. 2000; 122(6):553-68.
 23. Pishak VP, Ushenko OH, redaktory. Lazerna poliarymetrychna diahnostyka v biolohii ta medytsyni [Laser polarimetric diagnostics in biology and medicine]. Chernivtsi: Medakademiia; 2000. 305 s. (in Ukrainian).
 24. Ushenko AG, Angel'skij OV, Arheljuk AD, Ermolenko SB, Burkovec DN. Rassejanie lazernogo izlucheniya multifraktal'nymi biostrukturami [Scattering of laser radiation by multifractal biostructures]. Optika i spektroskopija. 2000;88(3):495-8. (in Russian).
 25. Ushenko AG. Poljarizacionnaja struktura biospeklov i depoljarizacija lazernogo izluchenija [Polarization structure of biospectra and depolarization of laser radiation]. Optika i spektroskopija. 2000;88(4):651-4. (in Russian).
 26. Gerrard A, Burch JM. Introduction to matrix methods in optics. New York: Dover Publications, Inc; 1975.
 27. Ushenko AG. Stokes Correlometry of Biotissues. Laser Physics. 2000;10(6):1286.
 28. Pishak VP, Ushenko OH, Pishak OV. Doslidzhennia mikrostrukturny kistkovoi tkany u poliaryzovanomu lazernomu svitli [Investigation of bone tissue microstructure in polarized laser light]. Medychni perspektivy. 2000;5(4):3-7. (in Ukrainian).
 29. Pishak VP, Ushenko OH, Pishak OV. Doslidzhennia dynamiky patolohichnykh zmin dyspersii ta kontrastu koherentnykh zobrazhen' kistkovoi tkany [Research of dynamics of pathological changes of dispersion and contrast of coherent images of bone tissue]. Ukrains'kyi medychnyi al'manakh. 2000;3(4):170-3. (in Ukrainian).
 30. Ushenko AG. Laser polarization microscopy of biofractals. Proc SPIE. 1998;3573:609-12.
 31. Ushenko AG, Burkovets DM, Yermolenko SB, Arkhelyuk AD, Pishak VP, Pishak OV, et al. Laser polarimetry of the orientational structure of bone tissue osteons. Proc SPIE. 1999;3904:557-61.
 32. Ushenko AG, Burkovets DM, Yermolenko SB, Arkhelyuk AD, Ushenko YA, Pishak VP, et al. Polarized mikrostruktur of laser radiation scattered by optically active biotissues. Proc SPIE. 1999;3904:542-8.
 33. Ushenko AG. Laser polarimetry of polarization-phase statistical moments of the objects field of optically anisotropic scattering layers. Optics and Spectroscopy. 2001;91(2):313-6.
 34. Angel'skij OV, Ushenko AG, Burkovets DN, Ushenko YuA. Polarization-correlation analysis of anisotropic structures in bone tissue for the diagnostics of pathological changes. Optics and Spectroscopy. 2001;90(3):458-62.
 35. Ushenko AG. Laser probing of biological tissues and the polarization selection of their images. Optics and Spectroscopy. 2001;91(6):932-6.
 36. Ushenko AG. Polarization contrast enhancement of images of biological tissues under the conditions of multiple scattering. Optics and Spectroscopy. 2001;91(6):937-40.
 37. Yermolenko SB, Angelsky OV, Ushenko AG, Pishak VP, Pishak OV. Laser polarimetry tomography of biotissue pathological changes. Proc SPIE. 2001;4425:117-23.
 38. Tuchin VV, Maksimova II, Zimnyakov DA, Kon IL, Mavlyutov AH, Mishin AA. Light propagation in tissues with controlled optical properties. J Biomed Opt. 1997;2(4):401-17. doi: 10.1117/12.281502
 39. Jyzwicki R, Patorski K, Angelsky OV, Ushenko AG, Burkovets DN, Ushenko YA. Automatic polarimetric system for

- early medical diagnosis by biotissue testing. Optica Applicata. 2002;32(4):603-12.
40. Angel'skij OV, Ushenko AG, Arheljuk AD, Ermolenko SB, Burkovec DN. O strukture matric preobrazovaniya lazernogo izlucheniya biofraktalami [On the structure of matrices for the conversion of laser radiation by biofractals]. Kvantovaja elektronika. 1999;29(3):235-8. (in Russian).
41. Ushenko AG. Polarization introscopy of phase-inhomogeneous layers. Proc SPIE. 2002;4900:1323-6.
42. Angelsky OV, Ushenko AG, Burkovets DN, Pishak VP, Pishak OV. Laser polarimetry of pathological changes in biotissues. Proc SPIE. 2002;4900:1045-9.
43. Ushenko AG, Pishak VP, Pishak OV, Olar OI, Yermolenko SB, Prydij AG, et al. Mueller matrices mapping of biological tissue architectonics. Proc SPIE. 2004;5477:422-9.
44. Ushenko AG. 2D phase tomography of biotissues: I. Topological structure value of birefringence. Proc SPIE. 2004;5477:438-9.
45. Ushenko AG. 2D phase tomography of biotissues: II. Polarization visualization and selection of biotissue image two-layer scattering medium. Proc SPIE. 2004;5477:450-6.

Відомості про авторів:

Остасфійчук Д.І. - асистент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці, Україна.

Горкуненко А.Б. - доцент кафедри медичної фізики, діагностичного та лікувального обладнання ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", м. Тернопіль, Україна.

Плаксива Т.О. - студентка медичного факультету №1 ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці, Україна.

Скринська Н.А. - студентка медичного факультету №1 ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці, Україна.

Сведения об авторах:

Остасфійчук Д.І. - асистент кафедры биологической физики и медицинской информатики ВГУЗ Украины "Буковинский государственный медицинский университет", г.Черновцы, Украина.

Горкуненко А.Б. - доцент кафедры медицинской физики, диагностического и лечебного оборудования ГВУЗ "Тернопольский государственный медицинский университет им.И.Я.Горбачевского МОЗ Украины", г.Тернополь, Украина.

Плаксивая Т.А. - студентка медицинского факультета №1 ВГУЗ Украины "Буковинский государственный медицинский университет", г. Черновцы, Украина.

Скрынская Н.А. - студентка медицинского факультета №1 ВГУЗ Украины "Буковинский государственный медицинский университет", г.Черновцы, Украина.

Information about the authors:

Ostafiychuk D.I - assistant professor of the Department of Biological Physics and Medical Informatics VDNZ Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Gorkunenko A.B - Associate Professor of the Department of Medical Physics, Diagnostic and Medical Equipment, State Institution of Higher Education "Ternopil State Medical University named after I.Ya.Gorbachevsky of the Ministry of Health of Ukraine", Ternopil, Ukraine.

Plaksiva T.O. - student of medical faculty №1 of the Department of Higher Education of Ukraine "Bukowina State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Skrinskaya N.A. - student of medical faculty №1 of VDNZ Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi, Ukraine.

Стаття надійшла до редакції 12.02.2018

Рецензент – проф. В. Бачинський

© Д.І. Остасфійчук, А.Б. Горкуненко, Т.О. Плаксива, Н.А. Скринська, 2018