

Міністерство охорони здоров'я України  
Буковинський державний медичний університет

# БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК

Український науково-практичний журнал

Заснований у лютому 1997 року

Видається 4 рази на рік

*Включений до Ulrichsweb™ Global Serials Directory, наукометричних і  
спеціалізованих баз даних Google Scholar, Index Copernicus International  
(Польща), Scientific Indexing Services (США),  
Infobase Index (Індія), Ukrainian research & Academy Network (URAN),  
НБУ ім. Вернадського, "Джерело"*

**ТОМ 25, № 2 (98)**

---

**2021**

**Редакційна колегія:**

головний редактор Т.М. Бойчук,

О.Б. Бєліков, О.І. Годованець, І.І. Заморський,

О.І. Івашук (перший заступник головного редактора),

Т.О. Ілащук, А.Г. Іфтодій, Г.Д. Коваль, О.К. Колоскова,

В.В. Кривецький (заступник головного редактора),

В.В. Максим'юк, Т.В. Мохорт, Н.В. Пашковська, Л.П. Сидорчук,

С.В. Сокольник, В.К. Тащук (відповідальний секретар), С.С. Ткачук,

О.І. Федів (відповідальний секретар), О.В. Цигикало

**Наукові рецензенти:**

проф. І.І. Заморський, проф. Л.П. Сидорчук, проф. С.С. Ткачук

**Редакційна рада:**  
К.М. Амосова (Київ), В.В. Бойко (Харків),  
А.І. Гоженко (Одеса), В.М. Запорожан (Одеса),  
В.М. Коваленко (Київ), З.М. Митник (Київ),  
В.І. Паньків (Київ), В.П. Черних (Харків),  
Герхард Дамман (Швейцарія),  
Збігнев Копанські (Польща),  
Дірк Брутцерт (Бельгія),  
Раду Крістіан Дабіша (Румунія)  
Віктор Ботнару (Респ. Молдова)

Рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет рішенням вченої ради  
Буковинського державного медичного університету  
(протокол № 9 від 27.05.2021 року)

**Буковинський медичний вісник**  
(Бук. мед. вісник) –  
науково-практичний журнал, що  
рецензується

Bukovinian Medical Herald  
(Buk. Med. Herald)

Заснований у лютому 1997 р. Видається 4  
рази на рік

Founded in February, 1997 Published four  
times annually

Мова видання: українська, російська,  
англійська

Сфера розповсюдження загальнодержавна,  
зарубіжна

Свідоцтво про державну реєстрацію:  
серія КВ №15684-4156 ПР від 21.09.2009

#### **Наказом**

Міністерства освіти і науки України від  
17 березня 2020 року № 409 журнал  
“Буковинський медичний вісник”  
включено до категорії “Б” (медичні  
спеціальності - 222) переліку наукових

фахових видань України

Адреса редакції: 58002, м. Чернівці,  
пл. Театральна, 2

Тел.: (0372) 55-37-54,  
52-40-78

Факс: (0372) 55-37-54  
e-mail: [bmh@bsmu.edu.ua](mailto:bmh@bsmu.edu.ua)

Адреса електронної версії журналу в  
Internet:

<http://e-bmv.bsmu.edu.ua>

## **ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ІНШОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ОКРЕМИХ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ЧИННИКІВ**

**O.I. Іващук<sup>1</sup>, I.O. Малишевський<sup>2</sup>, Ю.М. Мишковський<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

<sup>2</sup>ОКНП "Чернівецький обласний клінічний онкологічний центр", м. Чернівці, Україна

**Ключові слова:**

злойкісні новоутворення, черевна порожнina, статистика, чинники ризику.

Буковинський медичний вісник. Т.25, № 2 (98). С. 55-59.

**DOI:** 10.24061/2413-0737.XXV.2.98.2021.9

**E-mail:** myshkovsky@i.ua

**Мета роботи** – здійснити порівняльний статистично-епідеміологічний аналіз захворюваності на злойкісні новоутворення (ЗН) органів черевної порожнини та іншої локалізації у Буковинському регіоні, та можливі детермінантні чинники.

**Матеріал і методи.** Дослідження виконане на базі ОКНП "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" та клініки онкології Буковинського державного медичного університету й охоплює матеріали спостереження статистичної звітності 21259 випадків ЗН різної локалізації. Розрахунок показників здійснювали за допомогою програмних пакетів Access та Excel на базі середовища Microsoft Office.

**Результати.** Серед усіх ЗН різної локалізації новоутворення органів черевної порожнини становлять близько третини (32,4%) або 37,1% від числа тих, у кого діагноз ЗН був встановлений уперше, їх вирізняють значна частка III-IV стадій та порівняно висока летальність. Порівняно з новоутвореннями іншої локалізації, ЗН органів черевної порожнини є поширеними, перевищуючи приблизно удвічі кількість ЗН шкіри та молочної залози. Високу летальність відзначали при ЗН стравоходу (72,4%), шлунка (56,2%), гепатобіліарної системи та підшлункової залози (67,5-71,4%).

**Висновки.** Злойкісні новоутворення органів черевної порожнини посідають важе місце у загальній структурі новоутворень різної локалізації. Дані злойкісних новоутворень характеризуються високими рівнями летальності та недостатньою ефективністю лікування, що потребує додаткового вивчення.

## **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ДРУГОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТЕРМИНАНТНЫХ ФАКТОРОВ**

**А.И. Иващук, И.А. Малишевский, Ю.Н. Мишковский**

**Ключевые слова:**

злокачественные новообразования, брюшная полость, статистика, факторы риска.

Буковинский медицинский вестник. Т.25, № 2 (98). С.55-59.

**Цель работы** – осуществить сравнительный статистически-эпидемиологический анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) органов брюшной полости и другой локализации в Буковинском регионе, и возможные детерминантные факторы.

**Материал и методы.** Исследование выполнено на базе ОКНП "Черновицкий областной клинический онкологический диспансер" и клиники онкологии Буковинского государственного медицинского университета и охватывает материалы наблюдения и статистической отчетности 21259 случаев ЗН различной локализации. Расчет показателей осуществляли с помощью программных пакетов Access и Excel на базе среды Microsoft Office.

**Результаты.** Среди всех ЗН различной локализации новообразования органов брюшной полости составляют около трети (32,4%), или 37,1% от числа тех, у кого диагноз ЗН был установлен впервые, их отличают значительная часть III-IV стадий и сравнительно высокая летальность. По сравнению с новообразованиями другой локализации, ЗН органов брюшной

## Оригінальні дослідження

---

полости являються распространенными, превышая по крайней мере вдвое количество ЗН кожи и молочной железы. Высокую летальность отмечали при ЗН пищевода (72,4%), желудка (56,2%), пищеварительной системы и поджелудочной железы (67,5-71,4%).

**Выводы.** Злокачественные новообразования органов брюшной полости занимают важное место в общей структуре злокачественных новообразований различной локализации. Данные злокачественные новообразования характеризуются высокими уровнями летальности и недостаточной эффективностью лечения, которые требуют дополнительного изучения.

---

## **COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF REGIONAL MORBIDITY OF MALIGNANT NEOPLASMS OF THE ABDOMINAL CAVITY AND OTHER LOCALIZATIONS CONSIDERING CERTAIN DETERMINING FACTORS**

**O.I. Ivashchuk, I.O. Malyshevsky, Yu.M. Myshkovsky**

**Key words:** malignant neoplasms, abdominal cavity, statistics, risk factors.

Bukovinian Medical Herald. V.25, № 2 (98). P. 55-59.

*The aim – To carry out a comparative statistical and epidemiological analysis of the incidence of malignant neoplasms (MN) of the abdominal cavity and other localizations in the Bukovyna region and possible determining factors.*

**Material and methods.** The study was performed on the basis of RMNE "Chernivtsi Regional Clinical Oncology Center" and the Oncology Clinic of Bukovinian State Medical University and covers observation materials and statistical reports of 21259 cases of MN of various localization. Indicators were calculated using Access and Excel software packages based on the Microsoft Office environment.

**Results.** Among all MN of different localization, neoplasms of abdominal organs make up about a third (32.4%), or 37.1% of those diagnosed with MN for the first time, they are distinguished by a significant proportion of III-IV stages and relatively high mortality. In comparison with neoplasms of other localization, the MN of the abdominal organs is common, exceeding at least twice the number of MN of the skin and breast. High mortality was observed in the esophagus (72.4%), stomach (56.2%), hepatobiliary system, and pancreas (67.5-71.4%).

**Conclusions.** MNs of abdominal organs occupy an important place in the general structure of new growths of various localization. MN data are characterized by high mortality rates and insufficient effectiveness of treatment, which requires additional studies.

---

**Вступ.** За даними Національного центру статистики охорони здоров'я США (National Center for Health Statistics) у 2020 році в Сполучених Штатах прогнозується 1 806 590 нових випадків раку та 606 520 смертей від раку. Рівень смертності від раку в США зростав до 1991 року, але потім спостерігалося загальне зниження на 29%, що на 2,9 мільйона менше смертей від злокісних новоутворень (ЗН), ніж могло б статися, якби пікові показники 1991 року збереглися незмінними. Такий прогрес зумовлений довготривалим зниженням рівня смертності серед чотирьох провідних видів ЗН: легенів, кольоректального раку, молочної залози і простати. Однак упродовж останніх років (2008-2017 рр.) скорочення смертності уповільнилося для раку молочної залози та кольоректального раку й зупинилося для ЗН простати. Навпаки, спостерігалося прискорене зниження рівня ЗН легенів – з 3% щорічно протягом 2008-2013 років до 5% протягом 2013–2017 років у чоловіків та з 2% до майже 4% у жінок, сприяючи найбільшому річному

падінню загальної смертності від ЗН (2,2% упродовж 2016-2017 років). Таким чином, уповільнення темпу розвитку деяких видів ЗН, що піддаються ранньому виявленню, поєднується з помітним приростом інших поширеніших видів раку [1, 2].

Ймовірність діагнозу інвазивного ЗН упродовж життя дещо вища у чоловіків (40,1%), ніж у жінок (38,7%). Причини підвищеного ризику в чоловіків до кінця не зрозумілі, певною мірою відображають відмінності впливу навколошнього середовища, способу життя, дієти та гормонів, а також складну взаємодію між цими чинниками [3].

Показаний вплив окремих детермінантних чинників (ожиріння, цукровий діабет 2-го типу, метаболічний синдром тощо) у виникненні злокісних новоутворень (ЗН) різної локалізації, зокрема кольоректального раку [4, 5].

Згідно з даними Національного канцер-реєстру України, в онкологічних закладах України упродовж останньої декади у середньому щорічно на обліку в спе-

ціалізованих онкологічних закладах перебувало близько 1 млн осіб (2000 на 100 тис. дорослого населення). Контингент жінок превалює над чоловіками майже удвічі внаслідок відмінностей у структурі захворюваності та летальності [6].

Розвиток онкоепідеміологічного процесу характеризувався незначимим зростанням рівня захворюваності та зменшенням рівня смертності. В Україні, структура контингенту хворих на злюкісні новоутворення (ЗН) в осіб чоловічої статі формується, в основному, за рахунок пухлин шкіри, легень, передміхурової залози, сечового міхура та ободової кишки (блізько 60,0%); у жінок – за рахунок пухлин молочної залози, шкіри та репродуктивних органів (блізько 70,0%) [7, 8].

Аналіз епідеміологічних даних показує щорічне суттєве зростання реєстрації ЗН органів черевної порожнини на фоні незначного зниження частоти зустрічальності та летальності онкопатологій іншої локалізації [7, 9].

Таким чином, ЗН органів черевної порожнини і травної системи у цілому – посідають одне з найбільш важливих місць у загальній структурі онкологічної патології. Проте окрім особливості ЗН органів черевної порожнини, а також їх детермінантні чинники потребують уточнення. Зокрема важливим є порівняння статистично-епідеміологічних показників ЗН із локалізацією у черевній порожнині та іншої локалізації, що дозволить зрозуміти вплив яких саме чинників є детермінантним.

### **Мета дослідження**

Здійснити порівняльний статистично-епідеміологічний аналіз захворюваності на злюкісні новоутворення органів черевної порожнини та іншої локалізації у Буковинському регіоні, та можливі детермінантні чинники.

### **Матеріал і методи**

Дослідження виконане на базі ОКНП "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" та клініки онкології Буковинського державного медичного університету й охоплює матеріали спостереження упродовж 2015-2019 років та статистичної звітності стосовно 21259 випадків захворювань на ЗН різної локалізації. При виконанні дослідження керувались загальноприйнятими нормами біоетики відповідно до Директиви ЄСЕ № 609 від 24.11.1986 р., GCP (1996 р.), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2000 рр.), наказу МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р та наказу МОЗ України № 616 від 03.08.2012 р.

Визначалася динаміка змін наступних показників: абсолютна кількість хворих досліджуваної локалізації, захворюваність на 100000 населення, відсоток запущених випадків ЗН, відсоток морфологічно підтверджених ЗН, охоплення обліком та охоплення лікуванням, смертність загальна та упродовж року, стадійність діагнозу. Із загальної когорти хворих на ЗН різної локалізації були відібрані для подальшого порівняльного аналізу ті, що відповідали наступним шифрам за МКБ-10: C15, C16,

C17, C18, C19-C21, C22, C23-C24, C25, C26, C53, 54, C56, C48, C55, C57 [6]. Розрахунок відповідних показників здійснювали за допомогою програмних пакетів Access та Excel на базі системи Microsoft Office Online відповідно до керівництва по користуванню.

### **Результати дослідження та їх обговорення**

Опрацьовані результати спостереження хворих на ЗН органів черевної порожнини та розраховані клінічно-статистичні параметри стосовно цих нозологій наведені у таблиці 1.

Серед усіх ЗН різної локалізації, новоутворення органів черевної порожнини становлять близько третини (32,4%) або 37,1% від числа тих, у кого діагноз ЗН був встановлений уперше, що свідчить про важливість подальшого дослідження даної проблеми. Порівняння з клінічно-статистичними показниками окремих злюкісних новоутворень іншої локалізації (табл. 2), зокрема, найбільш поширеними – пухлинами шкіри (16,3% від загальної кількості новоутворень на обліку), ЗН молочної залози (13,2%), бронхолегенової системи (3,6%) та простати (4,0%), показує, що ЗН органів черевної порожнини є дуже поширеними, перевищуючи принаїмні удвічі кількість ЗН шкіри та молочної залози.

Як видно з даних табл. 1, у загальній структурі ЗН черевної порожнини, переважають колоректальні ЗН, ЗН жіночої статевої сфери та шлунка. Інші ЗН черевної порожнини відіграють дещо меншу роль у загальній структурі ЗН різної локалізації.

Порівняно з новоутвореннями іншої локалізації, слід відзначити високий рівень запущених форм раку бронхолегенової системи (85,2% – III-IV ст.), а також високий рівень ранніх форм ЗН шкіри та молочної залози (97,7-68,4% - I ст.). ЗН жіночої статевої сфери характеризується більш ранніми стадіями, негативний розподіл за стадіями спостерігається стосовно ЗН шлунка, стравоходу, печінки, позапечінкових жовчовивідних шляхів та підшлункової. Узагальнений розподіл за стадіями перебігу ЗН органів черевної порожнини був наступним – I-II – 36,6%, III – 42,8%, IV – 31,8%, тобто усереднений розподіл хворих на ЗН органів черевної порожнини за стадіями був відносно рівномірним, незважаючи на суттєві відмінності при різних локалізаціях новоутворень.

Високу летальність (до року) відзначали при ЗН стравоходу (72,4%), шлунка (56,2%), гепатобіліарної системи та підшлункової залози (67,5-71,4%). Серед обраних для порівняння ЗН іншої локалізації найбільші показники летальності характерні для ЗН бронхолегенової системи (60,0%), простати (25,5%), лімфоми (23,4%). Летальність при ЗН молочної залози становила лише 9,5%.

Отримані та наведені у табл. 1-2 дані показують, що ЗН органів черевної порожнини є одними з найбільш поширеніх. Їх відрізняють значна частка III-IV стадій та порівняно висока летальність. Отримані дані узгоджуються з показниками, наведеними в Національному канцер-реєстрі України, де вказується про чільне місце ЗН трахеї, бронхів та легені (15,0%), ЗН передміхурової

Таблиця 1

## Клінічно-статистичні показники золякісних новоутворень органів черевної порожнини

Локалізація ЗН	На обліку абс. / %	Вперше встановлений д- з (абс. / %)	Виявлено при проф. оглядах	Стадія (TNM)			На обліку понад 5 років (абс. / %)	Морфологічно підтверджені (абс. / %)
				I-II ст.	III ст.	IV ст.		
Справохід	87 / 0,4	23 / 26,4	0	4	5	6	53 / 0,4	39 / 0,3
Шлунок	788 / 3,7	130 / 16,5	9	21	32	65	550 / 3,7	469 / 3,5
Свободова кішка	1115 / 5,3	145 / 13,0	4	62	35	43	689 / 4,6	564 / 4,2
Ректоанальна ділянка	911 / 4,3	129 / 14,2	8	64	25	33	526 / 3,5	485 / 3,1
Півйки матки	1388 / 6,5	55 / 4,0	12	34	12	6	1123 / 7,6	1109 / 8,2
Тіла матки	1723 / 8,1	121 / 7,0	18	84	17	4	1224 / 8,2	1219 / 9,0
Яєчники	567 / 2,7	64 / 11,3	5	16	27	10	393 / 2,6	365 / 2,7
Тонка кішка	20 / 0,01	4 / 20,0	0		1	0	15 / 0,1	13 / 0,1
Печінка	76 / 0,4	25 / 32,9	2	1	11	7	46 / 0,3	14 / 0,1
Жовчовивідні шляхи	42 / 0,2	12 / 28,6	1	3	0	6	26 / 0,2	17 / 0,1
Підшлункова залоза	168 / 0,8	63 / 37,5	2	19	6	23	80 / 0,7	19 / 0,2
Загалом усіх ЗН органів черевної порожнини	6885 / 32,4	771 / 37,1	61 / 21,24	308 / 36,6	171 / 42,8	203 / 41,0	4725 / 31,8	4313 / 31,8
Загалом усіх ЗН	21259	2076	286	841	400	495	14865	13553

**Таблиця 2****Клінічно-статистичні показники окремих злоякісних новоутворень іншої локалізації**

Локалізація ЗН	На обліку абс. / %	Вперше встановлений д- з (абс. / %)	Виявлено при проф. оглядах	Стадія (TNM)				На обліку понац. 5 рохів (абс. / %)	Морфологічно підтверджені (абс. / %)
				I-II ст.	III ст.	IV ст.	На обліку понац. 5 рохів (абс. / %)		
Трахей, бронхі та легені	770 / 3,6	263 / 12,7	28	36	79	128	447 / 3,0	199 / 1,5	
Молочні залози	2805 / 13,2	198 / 9,5	48	132	38	23	1896 / 12,8	1865 / 13,8	
ЗН шкіри (без меланоми)	3454 / 16,3	148 / 7,1	81	126	6	0	2751 / 18,5	2673 / 19,7	
Простати	857 / 4,0	118 / 5,7	7	58	6	37	439 / 3,0	415 / 3,1	
ЗН шлункової залози	527 / 2,5	30 / 1,5	6	14	5	2	351 / 2,4	346 / 2,6	
ДОР-органів	40 / 0,2	2 / 0,1							31 / 0,2
Злоякісні лімфоми	851 / 4,0	85 / 4,1	4	22	11	10	582 / 3,9	580 / 4,3	
Загалом усіх ЗН	21259	2076	286	841	400	495	14865	13553	

## Оригінальні дослідження

залози (12,1%), немеланомних ЗН шкіри (9,9%), рак шлунка (6,9%) та ободової кишки (6,8%), що разом становить 50,7% у структурі захворюваності на рак чоловічого населення України. У жінок, за даними Національного канцер-реєстру України, превалують ЗН молочної залози (20,6%); немеланомні ЗН шкіри (12,5%); рак тіла матки (9,6%); ЗН ободової кишки (6,6%) – усього 49,3% [6].

Певні відмінності між отриманими нами даними та усередненими даними Національного канцер-реєстру є наслідком стратифікації за статевою ознакою, а також можуть мати місце впливу локальних чинників соціально-економічного характеру, популяційні чинники тощо [6]. Серед можливих детермінантних чинників ризику несприятливих наслідків лікування ЗН органів черевної порожнини привертають увагу метаболічні порушення, ожиріння та надмірна маса тіла, які обтяжують стан хворих при різних патологічних процесах [9, 10]. Більше того, спорідненість патогенетичних механізмів ожиріння та канцерогенезу створюють нові виклики для хірурга-онколога та потребують вирішення [2, 9, 11].

### Висновки

1. Злюкіні новоутворення органів черевної порожнини посидають вагоме місце у загальній структурі злюкіні новоутворень різної локалізації, що засвідчує важливе значення подальших досліджень. 2. Злюкіні новоутворення даної локалізації характеризуються порівняно високими рівнями летальності та недостатньою ефективністю лікування, що потребує додаткового вивчення.

### Перспективи подальших досліджень

Подальші дослідження ЗН органів черевної порожнини доцільно проводити стосовно можливих детермінантних чинників, які впливають на особливості їхнього патогенезу, діагностики та лікування, зокрема, метаболічний синдром, коморбідність та ожиріння.

### Список літератури

- Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2020. CA A Cancer J Clin. 2020;70(1):7-30. <https://doi.org/10.3322/caac.21590>.
- GBD 2015 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet.; 388 (10053):1659-1724.
- Klein SL, Flanagan KL. Sex differences in immune responses. Nat Rev Immunol. 2016;16:626-38.
- Soltani S, Abdollahi S, Aune D, Jayedi A. Body mass index and cancer risk in patients with type 2 diabetes: a dose-response meta-analysis of cohort studies. Sci Rep. 2021;11(1):2479. DOI: 10.1038/s41598-021-81671-0.
- Ioffe O, Dibrova Yu, Stets M, Perepadia VM, Ryabyi S, Knut R, et al. Early endoscopic photodynamic diagnosis of colonic lesions. The Medical-Surgical Journal (Revista Medico-Chirurgicala Iasi). 2020;124(3):419-24.
- Ukrainian cancer registry statistics, 2020. "Cancer in Ukraine", 2018-2019, Bulletin of national cancer registry of Ukraine (English) vol. 21 [Internet]. 2020 [cited 2021 Feb 12]. Available from: [http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL\\_21/index\\_e.htm](http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_21/index_e.htm).
- World Health Assembly, 70. [2017] Cancer prevention and control in the context of an integrated approach. World Health Organization. [Internet]. 2020 [cited 2021 Feb 12]. Available from: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/275676>.
- American Institute of Cancer Research & World Cancer Research Fund Global cancer data by country [Internet]. 2020 [cited 2020 Dec 30]. Available from: <https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/data-cancer-frequency-country>.
- Alemán JO, Eusebi LH, Ricciardiello L, Patidar K, Sanyal AJ, Holt PR. Mechanisms of obesity-induced gastrointestinal neoplasia. Gastroenterology. 2014;146(2):357-73. DOI: 10.1053/j.gastro.2013.11.051.
- Sartelli M, Abu-Zidan FM, Labricciosa FM, Kluger Y, Coccolini F, Ansaldi L, et al. Physiological parameters for prognosis in abdominal sepsis (PIPAS) Study: a WSES observational study. World J Emerg Surgery. 2019;14:34. DOI: 10.1186/s13017-019-0253-2.
- Carmichael JC, Keller DS, Baldini G, Bordeianou L, Weiss E, Lee L, et al. Clinical Practice Guidelines for Enhanced Recovery After Colon and Rectal Surgery From the American Society of Colon and Rectal Surgeons and Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. Dis Colon Rectum. 2017;60(8):761-84. DOI: 10.1097/DCR.0000000000000883.
- References**
- Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2020. CA A Cancer J Clin. 2020;70(1):7-30. <https://doi.org/10.3322/caac.21590>.
- GBD 2015 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioral, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet.; 388 (10053):1659-1724.
- Klein SL, Flanagan KL. Sex differences in immune responses. Nat Rev Immunol. 2016;16:626-38.
- Soltani S, Abdollahi S, Aune D, Jayedi A. Body mass index and cancer risk in patients with type 2 diabetes: a dose-response meta-analysis of cohort studies. Sci Rep. 2021;11(1):2479. DOI: 10.1038/s41598-021-81671-0.
- Ioffe O, Dibrova Yu, Stets M, Perepadia VM, Ryabyi S, Knut R, et al. Early endoscopic photodynamic diagnosis of colonic lesions. The Medical-Surgical Journal (Revista Medico-Chirurgicala Iasi). 2020;124(3):419-24.
- Ukrainian cancer registry statistics, 2020. "Cancer in Ukraine", 2018-2019, Bulletin of national cancer registry of Ukraine (English) vol. 21 [Internet]. 2020 [cited 2021 Feb 12]. Available from: [http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL\\_21/index\\_e.htm](http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_21/index_e.htm).
- World Health Assembly, 70. [2017] Cancer prevention and control in the context of an integrated approach. World Health Organization. [Internet]. 2020 [cited 2021 Feb 12]. Available from: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/275676>.
- American Institute of Cancer Research & World Cancer Research Fund Global cancer data by country [Internet]. 2020 [cited 2020 Dec 30]. Available from: <https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/data-cancer-frequency-country>.
- Alemán JO, Eusebi LH, Ricciardiello L, Patidar K, Sanyal AJ, Holt PR. Mechanisms of obesity-induced gastrointestinal neoplasia. Gastroenterology. 2014;146(2):357-73. DOI: 10.1053/j.gastro.2013.11.051.
- Sartelli M, Abu-Zidan FM, Labricciosa FM, Kluger Y, Coccolini F, Ansaldi L, et al. Physiological parameters for prognosis in abdominal sepsis (PIPAS) study: a WSES observational study. World J Emerg Surgery. 2019;14:34. DOI: 10.1186/s13017-019-0253-2.
- Carmichael JC, Keller DS, Baldini G, Bordeianou L, Weiss E, Lee L, et al. Clinical practice guidelines for enhanced recovery after colon and rectal surgery from the American Society of Colon and Rectal Surgeons and Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. Dis Colon Rectum. 2017;60(8):761-84. DOI: 10.1097/DCR.0000000000000883.

Original research

---

**Відомості про авторів**

Іващук О.І. – проректор з наукової роботи Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна.

Малишевський І.О. – генеральний директор ОКНП "Чернівецький обласний клінічний онкологічний центр", м. Чернівці, Україна.

Мишковський Ю.М. – асистент кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна.

**Інформація об авторах**

Іващук А.И. – проректор по научной работе Буковинского государственного медицинского университета, г. Черновцы, Украина.

Малишевский И.А. – генеральный директор ОКНП "Черновицкий областной клинический онкологический центр", г. Черновцы, Украина.

Мишковский Ю.М. – ассистент кафедры общей хирургии Буковинского государственного медицинского университета, г. Черновцы, Украина.

**Information about the authors**

Ivashchuk O.I. – Vice-Rector for Research at Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine;

Malyshevsky I. O. – General Director, Municipal Enterprise Bukovinian Clinical Oncology Center, Chernivtsi, Ukraine;

Mishkovsky Yu.M. – Assistant Professor of the General Surgery Department, Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine.

*Надійшла до редакції 5.03.2021*

*Рецензент — проф. Шкварковський І.В.*

*© О.І. Іващук, І.О. Малишевський, Ю.М. Мишковський, 2021*

---