

Асоціація хірургів України
Національний інститут хірургії та трансплантології
імені О. О. Шалімова НАМН України

КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ

№ 10 (906) жовтень 2017

Щомісячний науково—практичний журнал
(спеціалізоване видання для лікарів)
Заснований у червні 1921 р.

Нагороджений
«КРИШТАЛЕВИМ РОГОМ ДОСТАТКУ»,
медалями «ТРУДОВА СЛАВА»
та «ЛІДЕР НАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»
Міжнародної Академії
Рейтингових технологій та соціології
«Золота Фортуна»

Редактор
Г. В. Остроумова
Коректор
О. П. Заржицька

Видання включене до міжнародних наукометричних баз
Scopus, EBSCOhost, OCLC WORD CAT, UlrichsWeb,
Google Scholar та ін.
Журнал індексований в IndexMedicus, MedLine, PubMed.

Включений до Перелику наукових фахових видань України
Наказ МОН № 1413 від 24.10.17.

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія KB № 22539—12439ПР від 20.02.17.

Адреса редакції:
03680, м. Київ, МСП—03680,
вул. Героїв Севастополя, 30.
Тел./факс (044) 408.18.11,
<http://hirurgiya.com.ua>
e - mail: info@hirurgiya.com.ua
jcs@fm.com.ua

Передплатний індекс 74253
Підписано до друку 24.11.17. Формат 60 × 90/8.
Друк офсетний. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 10.
Обл. вид. арк. 9,72. Тираж 1000.
Замов. 294

Видавець
ТОВ «Ліга—Інформ»
03680, м. Київ, МСП 03680, вул. Героїв Севастополя, 30.
Тел./факс (044) 408.18.11.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб'єктів видавничої справи
ДК № 1678 від 04.02.04.

Надруковано з готових фотоформ
в друкарні ТОВ «ЛазуритПоліграф»
04048, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73.
Тел./факс (044) 463.73.01.

Розмноження в будь-якій формі матеріалів, опублікованих
в журналі, можливе тільки з письмового дозволу редакції.
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе
рекламодавець.

© Клінічна хірургія, 2017
© Ліга — Інформ, 2017

ISSN 0023 — 2130 (Print)
ISSN 2522 — 1396 (Online)



КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ

№ 10 (906) жовтень 2017

Головний редактор
О. Ю. Усенко

Заступники
головного редактора
С. А. Андрєєщев
М. В. Кости́лев

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Luigi Angrisani (Italy)
Л. С. Бліяньський
С. О. Возіанов
Martin Fried (Czech Republic)
В. Г. Гетьман
О. І. Дронов
М. Ф. Дрюк
Я. Л. Заруцький
М. П. Захараш
Г. П. Козинець
В. М. Копчак
О. Г. Котенко
А. С. Лаврик
В. В. Лазоришинець
John Melissas (Greece)
М. Ю. Ничитайло
С. Є. Подпрятков
А. П. Радзіховський
С. І. Саволюк
А. В. Скумс
Я. П. Фелешгинський
П. Д. Фомін
І. П. Хоменко
В. І. Цимбалюк
Rudolf Weiner (Germany)
С. О. Шалімов
П. О. Шкарбан

РЕДАКЦІЙНА РАДА

В. П. Андрющенко
Я. С. Березницький
В. В. Бойко
М. М. Велігоцький
В. В. Ганжий
Б. С. Запорожченко
І. В. Іоффе
П. Г. Кондратенко
І. А. Криворучко
В. І. Лупальцов
О. С. Никоненко
В. В. Петрушенко
В. І. Русин
В. М. Старосек
А. І. Суходоля
С. Д. Шаповал
І. М. Шевчук



МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

Р. І. Сидорчук, О. Й. Хомко, В. Б. Рева, О. І. Полянський, Л. П. Сидорчук, А. І. Попович
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

MORPHOLOGICAL CHANGES IN SYNDROME OF DIABETIC FOOT

R. I. Sydorchuk, O. J. Khomko, V. B. Reva, O. I. Polyanskyi, L. P. Sydorchuk, A. I. Popovych
Bukovyna State Medical University, Chernivtsi

Реферат

Вивчено динаміку локальних морфологічних змін при синдромі діабетичної стопи (СДС) у 215 хворих за умови адекватного місцевого лікування за розробленими стандартами. За даними гістологічних досліджень, відзначали зменшення набряку, клітинної інфільтрації, мікроциркуляторних розладів в крайовій зоні рани в динаміці лікування. Через 1 тиж від початку лікування у біоптатах виявляли молоді грануляційну тканину з великою кількістю петель судин, орієнтованих перпендикулярно рановій поверхні, і численних тяжів фіброblastів. Через 2 тиж спостерігали активну епітелізацію ранового дефекту в декілька шарів. З боку збереженої шкіри наповзав пласт, що вкривав ранову поверхню.

Ключові слова: синдром діабетичної стопи; хронічна рана; морфологічні зміни.

Abstract

Dynamics of local morphological changes in the diabetic foot syndrome was studied in 215 patients while achieving adequate local treatment in accordance to the standards elaborated. The histological investigations data witness reduction of oedema, cellular infiltration, microcirculatory disorders in marginal zone of the wound in the treatment dynamics. In one week from the treatment beginning young granulation tissue with big quantity of vascular loops, oriented perpendicularly towards the wound surface, and multiple cravings of fibroblasts were revealed. In two weeks an active epithelization of the wound defect in several layers was observed. From the side of the skin preserved a layer have crawled, covering the wound surface.

Keywords: syndrome of diabetic foot; chronic wound; morphological changes.

Синдром діабетичної стопи (СДС) є однією з найскладніших та актуальних проблем хірургії [1 – 3]. Лікування таких хворих є вкрай складним завданням, особливо при обтяженні загального стану хворих метаболічними розладами, у тому числі внаслідок цукрового діабету, порушення гемоциркуляції, впливу інших чинників, що пригнічують регенераторні та репаративні процеси, сприяють інфікуванню патологічних вогнищ, у тому числі збудниками з кишечника [4 – 6]. Навіть найбільш активне місцеве лікування хворих з приводу СДС неефективне, якщо воно не поєднується з технологіями, що сприяють очищенню гнійної рани та створюють сприятливі умови для регенераторних процесів [7, 8]. Водночас, різні аспекти патогенезу та морфології захворювання недостатньо вивчені та потребують уточнення.

Метою дослідження є вивчення морфологічних змін при СДС.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єктом дослідження були біоптати крайової зони ран шкіри

при гнійно–некротичних процесах м'яких тканин у хворих на цукровий діабет, ускладнений СДС. Проведене комплексне патоморфологічне дослідження біопсійного матеріалу у 215 хворих, яким проведено хірургічне лікування з приводу СДС за рекомендаціями European Association for Study of Diabetes та протоколами, затвердженими МОЗ України. Дотримані вимоги біоетики (GCP), всі хворі дали поінформовану згоду на участь у дослідженні. Біоптати країв рани досліджували після госпіталізації хворого, первинного оперативного втручання, а також на 3, 6, 9–ту та 15–ту добу лікування. Для оцінки динаміки перебігу ранового процесу в усіх хворих визначали ступінь зменшення площі ранової поверхні та утворення нової грануляційної тканини, проводили патоморфологічний моніторинг перебігу ранового процесу. Гістологічні зрізи вивчали, аналізували і фотографували з використанням системи аналізу зображень на базі комп'ютерної системи, що включала світловий мікроскоп Olympus CX–21 і цифрову камеру Olympus C450. Застосований комплекс сучасних гістометричних

досліджень [9]. Обчислювали показники об'ємної щільності необернено ушкоджених тканин, набрякової рідини, судинно–капілярного русла, лейкоцитарної інфільтрації волокнистої, епітеліальної, м'язової і жирової тканин. Виміри проводили за допомогою комп'ютерної системи аналізу зображень Image Tools 2.1.2. Статистична обробка результатів здійснена за методами варіаційної статистики з використанням програмного пакета Statistica 7.0 в операційному середовищі Windows 7 (SP3).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

На тлі некротичних змін виявлені елементи грануляційної тканини у вигляді коротких тонких тяжів проліферуючих фіброblastів веретеноподібної форми, що супроводжувалися капілярами; у 61 (28,4%) хворого ці зміни були відсутні. На відстані 0,1 – 0,3 мм від країв рани спостерігали ознаки регенерації епідермісу у вигляді невеликих тонких пластів новоутворених кератиноцитів. За даними гістологічних досліджень відзначали зменшення набряку

ку, клітинної інфільтрації, мікроциркуляторних розладів в крайовій зоні рани в динаміці лікування. На 6-ту добу лікування у біоптатах виявлена молода грануляційна тканина з великою кількістю петель судин, орієнтованих перпендикулярно рановій поверхні, і численних тяжів фібробластів (рис. 1). Тонкостінні судини розташовані рівномірно по всій грануляційній тканині, практично однакового діаметра. Судинна мережа займала $(16,6 \pm 1,5)\%$ регенерату. Серед фібробластів виявляли клітини з мітозами. набряк значно зменшився, інтенсивної лейкоцитарної інфільтрації регенерату не спостерігали. Характерною особливістю було виявлення в грануляційній тканині і в дермі прилеглої інтактної шкіри великої кількості опасистих клітин.

На 15-ту добу спостерігали активну епітелізацію ранового дефекту (2 – 4 шари). З боку збереженої шкіри




Рис. 1.
Мікрофото.
Крайова зона рани. Початок формування грануляційної тканини.
Забарвлення гематоксиліном та еозином.
Зб. $\times 400$.

наповзав новоутворений пласт, що вкривав ранову поверхню. Епітелій формував характерні пласти світлих клітин з широкою цитоплазмою. У дермі виявляли фібробласти з мітозами (рис. 2).




Рис. 2.
Мікрофото.
Крайова зона рани. Початкова (крайова) епітелізація. Старі грануляції з колагеновими волокнами.
Забарвлення трихромом за Гоморі.
Зб. $\times 400$.

Отже, за умов адекватного місцевого лікування за стандартами за даними гістологічних досліджень, відзначали зменшення набряку, клітинної інфільтрації, мікроциркуляторних розладів в крайовій зоні рани.

REFERENCES

1. Polovyi VP, Sydorhuk RI, Shaprynskyi VO, redaktory. Hniini protsesy m'iakyykh tkany: etiolohiia, patohenez, likuvannia: monohrafiia. Chernivtsi: Meduniversytet; 2013. 220 s. [In Ukrainian].
2. Fomin PD, Zhuchenko OP, Zheliba MD. Profilaktyka ta likuvannia hniino-zapalnykh uskladnen pisliaoperatsiinykh laparotomnykh ran v urhentnii khirurgii: monohrafiia. Zhytomyr: ZhDU im. I. Franka; 2009. 196 c. [In Ukrainian].
3. Puri V, Venkateshwaran N, Khare N. Trophic ulcers. Practical management guidelines. Br J Dermatology. 2012;45:340–51.
4. Kondratenko PG, Sobolev VV. Khirurgicheskaya infektsiya: prakticheskoe rukovodstvo. Donetsk: Novyi svit; 2007. 512 c. [In Russian].
5. Sydorhuk RI, Fundiur VD, Kulachek VF. Bakterialna translokatsiia pry hostromu perytoniti. Shpytalna khirurgiia. 2001;1:105–8. [In Ukrainian].
6. Sydorhuk LP, Amosova KM. Influence of pharmacogenetically determined treatment on parameters of peripheral hemodynamics in patients with arterial hypertension. New Armenian Med J. 2011;5(2):35–43.
7. Fonder MA, Lazarus GS, Mamelak AJ, et al. Treating the chronic wound: A practical approach to the care of nonhealing wounds and wound care dressings. J Am Acad Dermatol. 2008;58(2):185–206.
8. Skorkowska–Telichowska K, Czemplik M, Kulma A, Szopa J. The local treatment and available dressings designed for chronic wounds. Ibid. 2011;6:1–10.
9. Sydorhuk RI. Laser polarimetry of conjunctive biotissue. Proceedings of SPIE (Coherent Optics of ordered and random media II). 2001;4705:194–202.