

40-75 %, 20%

(Pteropodidae), *Henipavirus*

Henipavirus (Eidolon)

() -), (, , , ,)

(Pteropodidae).

Ludvigsson J.F., 2020), SARS-CoV-2 (. . . ., 2020;

SARS-CoV-2

n-line

75 , 64%

, 42,7% - (36%)

. 47,3% , 48%

, 40% - , 12% -

49,3%) 40% (, , ,)

, 41,3% - , 18,7% -

97,8% , 28,5%

. 18,7%

4 , 61,3% – (), 20% – 1
 , 1 , 30,7% .
 , , -

6- [2,1-B][1,3]

6-

[2,1-b][1,3] 3a-h

Trichophyton - Trichophyton interdigitale ATCC 9533
Candida, Candida krusei ATCC 6258, *Candida tropicalis* ATCC 20336.

1000 / .

96-

() ()

()

1,95-500 / .

6-

[2,1-b][1,3] 3a-h :

	<i>Candida krusei</i> ATCC 6258		<i>Candida tropicalis</i> ATCC 20336		<i>Trichophyton interdigitale</i> ATCC 9533	
	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)
3a	31,25	62,5	62,5	62,5	31,25	31,25
3b	31,25	31,25	31,25	62,5	31,25	31,25
3c	31,25	62,5	62,5	62,5	31,25	62,5
3d	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25
3e	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	125
3f	62,5	125	125	125	62,5	125
3g	62,5	62,5	62,5	125	62,5	125
3h	31,25	62,5	31,25	62,5	31,25	62,5

b][1,3]

6-

[2,1-

T. interdigitale ATCC 9533

: *C. krusei* ATCC 6258 *C. tropicalis* ATCC 20336 .

31,25 / 125 /

31,25 / 125 / .

6-

[2,1-b][1,3]