

© Польова С.П.

УДК 618.1-002.5-07:617.55-072.1

ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЯВЛЕННІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

С.П.Польова

Кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології (зав. – проф. О.М.Юзько) Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Проблема туберкульозу в Україні становить національну небезпеку серед репродуктивного населення [1, 2]. Наслідком туберкульозного

ураження геніталій у жінок є порушення репродуктивної функції: первинна безплідність (Бп) – у 82,2%, вторинна Бп – 17,8% [3, 4]. Однією з

провідних причин виникнення Бп є переважаюча локалізація туберкульозного процесу в маткових трубах та в матці [5, 6]. Частіше трапляються поєдання цих змін та приєдання до них неспецифічної мікрофлори. Незважаючи на нові досягнення в діагностиці туберкульозу жіночих статевих органів (ТЖСО), досі утруднена верифікація туберкульозу даної локалізації [7, 8].

Мета дослідження. Провести аналіз діагностики ТЖСО за допомогою новітніх технологій.

Матеріал і методи. Обстежено і прооперовано лапароскопічно 571 пацієнту віком 19–46 років із Бп нез'ясованої етіології та запальними захворюваннями геніталій. Із них у 21 пацієнти після лапароскопії та гістероскопії виявлено ТЖСО. Діагностично-лікувальна лапароскопія і гістероскопія проводилася з одночасним забором матеріалу для мікробіологічного та гістологічного дослідження з локальною біопсією. Пацієнткам проводили клінічне, імунологічне та інструментальне обстеження. Лапароскопію та гістероскопію виконували апаратом фірми "Karl Storz" (Німеччина) за загальнотрийнятою методикою. При виконанні гістероскопії після розширення цервіального каналу забирали матеріал із порожнини матки для мікробіологічного дослідження, після чого проводили саму гістероскопію.

Результати дослідження та їх обговорення. У 16 (76,2%) пацієнток із ТЖСО лапароскопію проводили планово: з підготовкою пацієнток до оперативного втручання. У 5 (23,8%) жінок проведена лапароскопія ургентно: з приводу пекручення дермоїдної кісти яєчника – 1 (4,7%), розриву гідро- та піосальпінкса – 2 (9,4%) та апоплексії яєчника – 2 (9,4%).

Гістероскопію проводили в 13 пацієнток з метою виявлення або підтвердження маткової патології щодо причини Бп після лапароскопії.

У всіх пацієнток ТЖСО виявлено після оперативного втручання та мікробіологічного і гістологічного дослідження.

Детальний ретроспективний аналіз історій хвороби показав, що в 12 (57,1%) із 21 пацієнтки на рентгенограмі органів грудної клітки було розширення коренів легень, у 5 (23,8%) – посилення бронхо-судинного рисунка, в 4 (18,8%) – відсутні будь-які ознаки захворювання легеневої системи, проте дві пацієнтки мали контакти з хворими на туберкульоз.

Первинна Бп мала місце в 14 (66,7%), вторинна – в 7 (33,3%) жінок. Скарги на пізнє менархе зазначали 16 (76,1%) обстежених, первинну amenорею – 11 (52,3%), а вторинну – 6 (28,6%)

пацієнток у пубертатному періоді. Порушення менструального циклу було в 7 (33,3%) пацієнток, серед них альгодисменорея – в 3 (14,2%), гіперполіменорея – в 4 (18,8%) хворих. У жінок із вторинною Бп невиношування вагітності в ранні терміни було в 4 (18,8%) пацієнток, у пізні терміни – в 1 (4,76%). Період Бп тривав від трьох до шести років. Специфічний запальний процес геніталій поєдувався з іншими гінекологічними захворюваннями в 15 жінок: у 8 (53,3%) – з ендокринною патологією, в 2 (13,3%) – з дермоїдною кістою, в 2 (13,3%) – з апоплексією яєчника, в 3 (20,0%) – з хламідіозом. Під час лапароскопії в 13 (61,9%) пацієнток виявлено спайковий процес II-IV ступеня, проведено адгезіолізис. У 18 (85,7%) хворих виявлено непрохідність однієї маткової труби і в 3 (14,3%) – обох. У двох пацієнток із гідросальпінксами виявлено маткові труби. В однієї хвоюї під час операції виявлено туберкульозний мезаденіт. Лапароскопічно вдалося запідозрити туберкульозний процес, проте неможливо було визначити його достеменність та активність, за винятком однієї пацієнтки, де мали місце класичні вкорочені ригідні та сегментовані маткові труби і горбикуваті висипання на очеревині.

Засіви пунктатів із дугласового простору підтвердили ТЖСО у 7 пацієнток (висівали L-форми мікобактерій туберкульозу). Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу підтвердило туберкульозне ураження в 11 пацієнток. У 3 пацієнток ТЖСО після 4-5-разового посіву менструальних виділень через 6 міс після лапароскопії.

Під час гістероскопії у 2 пацієнток порожніна матки була деформована з більшими тяжами, що могло вказувати на туберкульозний ендометрит. В однії пацієнтки виявлено розширену порожнину матки з близьким тонким атрофованим ендометрієм і в 3 випадках – синехії матки різних ступенів вираженості. Патологія порожнини матки гістероскопічно не виявлено.

Мікробіологічне дослідження вмісту порожнини матки, проведене до гістероскопії, підтвердило туберкульозне ураження в трьох випадках.

Морфологічне дослідження видалених маткових труб підтвердило специфічні зміни в них, які виражалися епітеліоїдними горбиками з гіантськими клітинами Лангханса, оточені лімфоцитами. У видалених дермоїдних кістах

спостерігали гіаліноз білкової оболонки, гіалінові тіла і ділянки зватнення.

У біоптатах ендометрія виявили метаплазію ендометрія, лімфогістіоцитарну інфільтрацію, гіпоплазію ендометрія, значно рідше – фіброз строми. Враховуючи анамнез захворювання, клініку та гістологічні непрямі ознаки туберкульозного ураження, діагноз туберкульозу геніталій підтверджився мікробіологічним дослідженням.

Висновки. 1. Застосування ендоскопічних методів діагностики та лікування в гінекологічній практиці дозволяє визначити наявність або відсутність специфічних змін у жіночих статевих органах, виявити і відновити анатомічні порушення геніталій. 2. Лапароскопія та гістероскопія – методи експрес-діагностики ту-

беркульозного ураження геніталій – дозволяють провести забір матеріалу для гістологічного та мікробіологічного дослідження прицільно з ураженої ділянки і дугласового простору, що є важливим для ідентифікації збудника туберкульозу та подальшого лікування пацієнток.

Перспективи подальших досліджень. Несприятлива епідеміологічна ситуація з туберкульозом заслуговує великої уваги до раннього виявлення геніタルного туберкульозу, оскільки своєчасне і ефективне лікування рідко дає позитивні результати відновлення репродуктивної функції, а вагітність після туберкульозу геніталій не завжди закінчується народженням живої здоровової дитини. Тому пошук нових методів діагностики і лікування туберкульозу залишається актуальним.

Література

1. Асмолов А.К., Павлова О.В. Геніタルний туберкулез у жінок // Укр. мед. часопис. – 2001. – № 4 (24). – С. 110-114.
2. Семеновский А.В., Ариэль Б.М., Попова С.С. Клинико-морфологические проявления туберкулеза гениталий у женщин // Арх.патологии. – 1998. – № 2. – С. 39-42.
3. Колачевская Е.Н. Принципы дифференциальной диагностики туберкулеза женских половых органов // Пробл. туберкулеза. – 1998. – № 5. – С. 15-18.
4. Кочорова М.Н., Семеновский А.В. Особенности гистеросальпингограмм при верифицированном туберкулезе гениталий // Пробл. туберкулеза. – 2002. – № 2. – С. 31-33.
5. Жученко О.Г., Степанова Т.В., Гуцуя П.Р. Геніタルный туберкулез и его хирургическое лечение // Пробл. туберкулеза. – 2001. – № 9. – С. 53-56.
6. Олейник А.Н., Баринов В.С. Активный туберкулез женских половых органов с вовлечением в процесс брюшины гениталий // Пробл. туберкулеза и болезни легких. – 2003. – № 10. – С. 42-43.
7. Польова С.П. Роль лапароскопії у діагностиці та лікуванні хронічних запальних захворювань геніталій // Шпит. хірургія. – 2003. – № 2. – С. 98-99.
8. Шалагин К.В. Клинический случай применения Беталейкина при туберкулезе женских гениталий // Цитокины и воспаление. – 2004. – Т. 3, № 4. – С. 47-49.

ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЯВЛЕННІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

С.П.Польова

Резюме. У статті наведений клінічний аналіз застосування новітніх технологій, мікробіологічного і гістологічного досліджень у діагностиці туберкульозного ураження жіночих статевих органів у пацієнток із безплідністю нез'ясованого генезу та з гнійно-запальними захворюваннями геніталій. Лапароскопія та гістероскопія є методами експрес-діагностики туберкульозу геніталій, проте вона потребує гістологічного та мікробіологічного підтвердження.

Ключові слова: туберкульоз геніталій, безплідність, лапароскопія, гістероскопія, гістологічне дослідження.

DIAGNOSTIC VALUE OF ADVANCED TECHNIQUES IN DETECTING TUBERCULOSIS OF THE FEMALE GENITAL ORGANS

S.P.Poliova

Abstract. The paper deals with a clinical analysis of using advanced techniques, microbiological and histological studies in detecting a tuberculous lesion of the female genital organs in patients with sterility of unknown genesis and with pyoinflammatory diseases of the genitals. It has been established that advanced techniques (laparoscopy, hysteroscopy) are the methods of instant diagnosis of genital tuberculosis. However, to make the diagnosis one needs a histological and microbiological confirmation.

Key words: genital tuberculosis, sterility, laparoscopy, hysteroscopy, histological investigation.

Bukovinian State Medical University (Chernivtsi)

Надійшла в редакцію 14.03.2005 р.