

Л.І. Бізер

КЛІНІЧНИЙ АНАМНЕЗ В ОЦІНЦІ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ РАКУ ЯЄЧНИКІВ ТА ЕНДОМЕТРІЮ

Кафедра онкології, променевої діагностики та терапії (науковий керівник – доц. О.П. Пересунько)
Буковинської державної медичної академії

На протязі останніх десятиріч'я робляться спроби виявити характерні взаємовідносини в організмі жінки, які пов'язані з ризиком розвитку пухлинної патології. Мета дослідження - визначити сукупність параметрів клінічного анамнезу жінок, хворих на рак яєчників та ендометрію, які можна розглядати як фактори ризику виникнення злюкісних пухлин. Нами здійснений багатофакторний аналіз даних клінічного анамнезу 520 жінок, хворих на рак яєчників, 482 жінок, хворих на рак ендометрію та 513 практично здорових жінок (контрольна група). Аналіз даних клінічного анамнезу жінок здійснювався за допомогою ЕОМ на програмі “Узагальнений портрет”. Дані вводилися в ЕОМ у вигляді інформаційної матриці, кожний рядок якої вміщував ознаки, що відповідають одному спостереженню, а кількість рядків матриці – числу спостережень. Кожному спостереженню надавався порядковий номер та номер класу. Перші два класи спостережень були дослідними (вибірки “рак яєчників” та “рак ендометрію”), третій – контролем (вибірка “контроль”). Багатофакторний аналіз проводився в два етапи. На першому етапі порівнювались ознаки за одним із дослідних класів спостережень з контролем. На другому етапі методом упорядкованої мінімізації ризику вибиралась оптимальна сукупність найбільш інформативних ознак. До факторів ризику розвитку раку яєчників та ендометрію віднесено 23 анамнестичні та клінічні ознаки: порушення менструальної та дігородної функцій, хронічні запальні процеси, доброкісні пухлини матки та додатків, передпухлинні захворювання шкіри, ізольовані вади розвитку. Виявлені інформативні ознаки даних клінічного анамнезу можуть бути використані для розробки критеріїв формування серед жіночого населення групи ризику стосовно раку яєчників та ендометрія.