



USAID | **УКРАЇНА**
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

ISSN 2220-5071

ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ

український науково-практичний журнал

№ 3 (18) 2014

Вірус Ебола: стан проблеми

Недоліки організації лікування хворих
на хіміорезистентний туберкульоз

Ефективність і переносимість
фторхінолонів

Tuberculosis

Lung diseases

HIV infection

ukrainian scientific
and practical journal

www.tubvil.com.ua
www.vitapol.com.ua

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Актуальні питання надання медичної допомоги хворим з поєднаною інфекцією: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити»

15—16 жовтня 2014 р., м. Київ

Нетрадиційні методи лікування хворих на туберкульоз

А.В. Бойко

Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

Поаяк туберкульоз (ТБ) головним чином виникає у людей зі зниженим імунітетом, призначення різноманітних народних засобів разом із медикаментозним лікуванням дає непогані наслідки, особливо у разі початкових ознак захворювання, коли відбуваються порушення на рівні дисбалансу енергії.

Матеріали та методи. Огляд літератури та WEB-джерел про нетрадиційні методи лікування хворих на ТБ.

Результати та висновки. Хорошим доповненням до комплексної терапії хворих на ТБ є прополіс. Для лікування можна застосовувати 10 % водний його екстракт. Розчин готують безпосередньо перед вживанням. У вогнестійкий скляний посуд наливають 10 мл дистильованої води, додають 10 г подрібненого прополісу. На водяній бані при температурі кипіння протягом години відбувається екстрагування (постійно помішувати). Суміш фільтрують крізь тонкий шар вати. Екстракт заливають через катетер інтратрахеально після попередньої анестезії гортані 1 % розчином дикаїну. На курс — 15—20 заливок. Потім можна перейти до аерозольного використання цього розчину.

Для лікування ТБ, супутньої бронхообструкції використовують також суміші з медом, а саме:

- 100 г меду, 100 г вершкового масла, 100 г смальцю або гусячого жиру, 15 г соку алое та 100 г какао змішати, розігріти, але не доводити до кипіння. Приймати по столовій ложці на склянку гарячого молока вранці і ввечері;
- 150 г свіжого соку алое змішати з 250 г меду та 350 мл вина (кагору), настояти в темному місці при температурі +4—8° протягом 4—5 діб. Приймати по столовій ложці 3 рази на день за півгодини до їди;
- листя алое промити, подрібнити і залити перевареною водою у співвідношенні 1 : 3 (перед тим, як рослину зрізати, не поливати її 5 діб). Через півгодини вичавити сік, потім 100 г соку алое змішати з 500 г подрібнених грецьких горіхів і додати 300 г меду. Приймати по столовій ложці 3 рази на добу за 30 хвилин до їди.

На початку захворювання на ТБ з успіхом використовують софору японську. Настоянка: 100 г сухих подрібнених плодів софори японської залити 0,5 л горілки. Настояти в темному місці 2 тиж, процідити. Зберігати у холодильнику. Приймати по 25 крапель на склянку води 3 рази на день за півгодини до їди.

Останнім часом використовують перекис водню, який гальмує життєдіяльність бактерій, вірусів, ракових клітин, виконує функцію окислювальної детоксикації й може протистояти будь-якій інфекції. Стимулює імунну систему. Починати потрібно з 2—3 крапель (звичайний аптечний 3 % розчин) 3 рази на добу. Щодня збільшувати прийом на 1 краплю і довести до 10 (не більше 30 крапель на добу). Приймати на порожній шлунок: уранці та ввечері за 30—40 хв до їди та через 2 год після вечері. Накапати в столову ложку і відразу випити, можна запити водою.

Nontraditional methods of treatment of TB patients

A.V. Boiko

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

Considering that tuberculosis (TB) mostly occurs in people with immunocompromised, the purpose of various popular recipes in conjunction with medical treatment leads to good results, especially when the initial signs of the disease, when the violation occurs at the level of imbalance energy. ■