

С.А.ЛевицькаБуковинський державний медичний
університет, м. Чернівці

ТИПОЛОГІЯ ДОМІНАНТ МІКРОФЛОРИ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ СИНУЇТАХ У ДІТЕЙ

Ключові слова: гострий і хронічний синуїт, мікробіоценоз.

Резюме. У 252 дітей, хворих на гострий і хронічний гнійний синуїти, вивчений видовий склад та популяційний рівень порожнинної мікрофлори середніх носових ходів. Визначено типологію домінант та спрямованість змін мікроекології носової порожнини при формуванні вогнища хронічного запалення. Встановлено, що гострий гнійний синуїт розвивається на фоні адомінантного мікробіоценозу. Абсолютною домінантною мікрофлори носової порожнини при хронічному синуїті є золотистий стафілокок.

Вступ

Причиною первинної альтерації слизової оболонки при розвитку запального процесу в навколоносових пазухах (ННП) є надмірний ріст бактерій у закритій порожнині [3]. Тому в етіологічному плані розвиток бактеріального синуїту є прикладом реалізації інфекційного процесу, спричиненого патогенними або умовно патогенними мікроорганізмами [4,5]. При цьому важливе значення мають як наявність факторів патогенності мікрофлори, її колонізаційний рівень, так і стан факторів неспецифічної резистентності і загальної імунореактивності. [6].

Мета дослідження

Розкрити механізми колонізації слизової оболонки при гострих і хронічних синуїтах у дітей шляхом визначення домінуючих, додаткових і транзиторних представників мікробіоценозу верхніх дихальних шляхів.

Матеріал і методи

Видовий склад та популяційний рівень порожнинної мікрофлори середніх носових ходів вивчений у 252 дітей, розподілених на дві групи. Першу групу склали 146 дітей із дебютом гнійного синуїту; другу – 106 дітей, у яких діагностовано загострення хронічного запалення ННП.

Мікробіологічне дослідження містило в собі виділення та ідентифікацію збудника, визначення популяційного рівня життездатних колонійтворюючих одиниць (КУО) в 1 мл ексудату. Для розкриття механізмів колонізації слизової оболонки мікроорганізмами використаний екологічний метод, що дозволив здійснити характеристику співіснування представників екосистеми «макроорганізм – мікрофлора» і прослідкувати спрямованість змін мікроекології верхніх дихальних шляхів при дестабілізації мікробіоценозу. Типологію домінант проводили на підставі визначення індекса постійності [2]. Для визначення міри дом-

інування певного виду мікроорганізму в біотопі вираховувалися індекси домінування Сімпсона, Бергера-Паркера та індекс полідомінантності [1].

Обговорення результатів дослідження

Мікробіоценоз носової порожнини при гострому запальному процесі в ННП характеризувався відсутністю чітко виражених мікробних домінант, про що свідчили низькі значення індексу домінування Сімпсона (табл. 1). Визначення індексів Бергера-Паркера та полідомінантності не дозволили встановити провідного етіотропного чинника гострого гнійного синуїту.

Встановлено, що розвиток гострого запального процесу в ННП зумовлюється різноманітною додатковою і транзиторною флорою. Згідно значень індексу постійності тільки золотистий стафілокок можна віднести до додаткових мікроорганізмів, всі інші ідентифіковані збудники можуть бути охарактеризованими як транзиторні.

Розвиток хронічного запального процесу в ННП супроводжується змінами в мікробіоценозі носової порожнини. Найбільш чисельними представниками порожнинної мікрофлори при хронічному синуїті, як і у випадках гострого запалення, залишаються грампозитивні коки, проте хронізація запального процесу відбувається при формуванні монодомінантного мікробіоценозу із абсолютноним переважанням золотистого стафілоко-ку (табл.2). Друге і третє місця, згідно індексу постійності, в ієархії мікробіоценозу займали дріжджоподібні гриби роду *Candida* і кишкова паличка. Доведена тенденція до зростання ролі алохтонних представників в колонізації біотопу при формуванні хронічного запального процесу свідчить про глибоке порушення колонізаційної резистентності слизової оболонки і розвиток дисбіозу при хронічному синуїті у дітей.

При хронічному запальному процесі в ННП відбувається зростання індексів домінування Бер-

Таблиця 1

Індекс постійності та індекси домінування компонентів мікробіоти носової порожнини у дітей при гострому гнійному синуїті

№пп	Мікроорганізми	C	D _S	D _{B-P}	S
Домінуючі види					
1.	Немає		-		
Додаткові види					
2.	S. aureus	45,45%	0,13	1	7,69
Транзиторні види					
3.	Moraxella catarralis	16,67%	0,02	2,73	50
4.	Str. pyogenes	13,64%	0,01	3,33	100
5.	Str. viridans	10,61%	0,01	4,29	100
6.	Escherichia coli	9,85%	<0,01	4,62	100
7.	Candida albicans	9,09%	<0,01	5	100
8.	Str. pneumoniae	6,06%	<0,01	7,5	100
9.	S.epidermidis	5,30%	<0,01	8,57	100
10.	Neisseria subflava	4,55%	<0,01	10	100
11.	S.saprophyticus	3,03%	<0,01	15	100
12.	Haemophilis influenzae	3,03%	<0,01	15	100

Примітка. С- індекс постійності, D_S – індекс домінування Сімпсона, D_{B-P} – індекс домінування Бергера-Паркера, S – індекс полідомінантності

Таблиця 2

Індекс постійності та індекси домінування компонентів мікробіоти носової порожнини у дітей при хронічному гнійному синуїті

№пп	Мікроорганізми	C	D _S	D _{B-P}	S
Домінуючі види					
1.	S. aureus	90,48%	0,19	1	5,26
Додаткові види					
2.	Candida albicans	40,48%	0,04	2,24	25
3.	Escherichia coli	26,19%	0,02	3,45	50
Транзиторні види					
4.	Str. pyogenes	14,29%	<0,01	6,33	100
5.	Str. viridans	14,29%	<0,01	6,55	100
6.	S.epidermidis	9,52%	<0,01	9,5	100
7.	Str. pneumoniae	3,57%	<0,01	25,33	100
8.	Moraxella catarralis	3,57%	<0,01	25,33	100
9.	Haemophilis influenzae	2,38%	<0,01	38	100

Таблиця 3

Індекс домінування Бергера-Паркера компонентів мікробіоти носової порожнини у дітей при гострому і хронічному синуїтах

№пп	Мікроорганізми	Індекс Бергера-Паркера	
		Перша група	Друга група
1.	S. aureus	1	1
2.	Moraxella catarralis	2,73	25,33
3.	Str. pyogenes	3,33	6,33
4.	Str. viridans	4,29	6,55
5.	Escherichia coli	4,62	3,45
6.	Candida albicans	5	2,24
7.	Str. pneumoniae	7,5	25,33
8.	S.epidermidis	8,57	9,5
9.	Neisseria subflava	10	-
10.	S.saprophyticus	15	-
11.	Haemophilis influenzae	15	38

гера-Паркера для Str. pneumoniae з 7,5 в першій групі до 25,33 в групі дітей, хворих на хронічний синуїт (табл. 3); для гемофільної палички – з 15

до 38, для Moraxella catarralis з 2,73 до 25,33. Це свідчить про втрату респіраторними патогенами етологічної ролі в розвитку загострень хронічно-

го синуїту, збідніння мікробного пейзажу носової порожнини при хронічному запаленні ННП і збільшення ступеню домінування провідного етіологічного чинника.

Згідно із значенням індекса Бергера-Паркера значимість кандид-асоціанта як етіологічного чинника розвитку загострення хронічного синуїту зростає вдвічі (табл. 3).

Таким чином, ідентифікація респіраторних патогенів з носових ходів не свідчить про розвиток запального процесу в ННП, оскільки і гемофільна паличка і *Moraxella catarralis* виділяються майже в кожній третьої здорової дитини.

Представників автохтонної флори носоглотки ідентифікують у носових ходах приблизно однаково часто як у хворих з гострою, так і хронічною формами запального процесу в ННП. Виявлений факт свідчить про те, що в реалізації запального процесу верхніх дихальних шляхів вид мікроорганізму не має вирішального значення. Викликати запальний процес може нормобіонт носоглотки, який захоплює нову біологічну нішу. Це може свідчити про порушення імунологічного контролю макроорганізмом за біологічною нішею.

Колонізація носових ходів алохтонними збудниками найчастіше відбувається при формуванні хронічного запального процесу в ННП. Це підтверджується найвищим відсотком виявлення ешерихій, грибів роду *Candida* при хронічному синуїті.

Контамінація носових ходів дітей, хворих на хронічний синуїт, алохтонними мікроорганізмами (золотистим стафілококом, ешерихіями, грибами роду *Candida*) може свідчити про порушення колонізаційної резистентності слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. Елімінація автохтонної облігатної флори і алохтонної флори з меншою кількістю факторів патогенності при недосконалому розрішенні попередніх епізодів синуїту приводить до захоплення звільненої біологічної ніші мікроорганізмами із більшою патогенностю.

Висновки

1. Мікробіоценоз носової порожнини дітей, хворих на гострий гнійний синуїт, є адомінантним із переважанням стафілококової флори.
2. Абсолютною домінантою порожнинної мікрофлори носової порожнини при хронічному синуїті є умовно патогенні коки, зокрема, золотистий стафілокок.
3. Етіологічна роль респіраторних патогенів в розвитку гострого і хронічного синуїтів незначна.
4. Порушення колонізаційної резистентності слизової оболонки, яке має місце при хронічному

синуїті, веде до захоплення звільненої біологічної ніші резидентами носоглотки або алохтонними для верхніх дихальних шляхів представниками мікрофлори.

Перспективи подальших досліджень

Вивчення мікроекології верхніх дихальних шляхів при запальних процесах навколоносових пазух дозволить поглибити уявлення про патогенетичне значення дисбіоценозу слизової оболонки у формуванні вогнища хронічного запалення і розробити засоби лікування і профілактики хронічних синуїтів.

Література. 1. География и мониторинг биоразнообразия / Лебедева Н.В., Криволукский Д.А., Пузаченко Ю.Г. и др./М.: Издательство Научного и учебно-методического центра, 2002. – 432 с. 2. Глебова Н.С. Изменения микробиоценоза кишечника под влиянием дестабилизирующего действия бластоцистной инвазии / Н.С.Глебова. – Вестник ОГУ. – 2007. - №5. – С. 155-160. 3. DeMuri G.P. Complications of acute bacterial sinusitis in children / G.P.DeMuri, E.R.Wald // Pediatr. Infect. Dis J. – 2011. – Vol.30(8). – P.701-702. 4. Pandak N. Bacterial colonization or infection in chronic sinusitis / N.Pandak, I.Pajic-Penavac, A.Sekelj [et al.] // Wien Klin.Wochenschr. – 2011. – Vol.123(23-24). – P.710-713. 5. Stressmann F.A. Characterization of bacterial community diversity in chronic rhinosinusitis infections using novel culture-independent techniques / F.A.Stressmann, G.B.Rogers, S.W.Chan [et al.] // Am J.Rhinol.Allergy. – 2011. – Vol.25(4). – P.133-140. 6. Wald E.R. Acute otitis media and acute bacterial sinusitis / E.R.Wald // Clin. Infect. Dis. – 2011. - Vol.52, Suppl. 4. – P.S277-S283.

ТИПОЛОГИЯ ДОМИНАНТ МІКРОФЛОРЫ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ ПРИ СИНУСИТАХ У ДЕТЕЙ

С.А.Левицкая

Резюме. У 252 дітей з острим і хроніческим гноїним синуситом изучен видовий состав и популяционный уровень полостной микрофлоры средних носовых ходов. Определена типология доминант и направленность изменений микроэкологии носовой полости при формировании очага хронического воспаления. Установлено, что острый гноїний синусит развивается на фоне адомінантного микробиоценоза. Абсолютной домінантой микрофлоры носової полости при хроническом синусите является золотистий стафілокок.

Ключевые слова: острый и хронический синусит, микробиоценоз.

TYPOLOGY OF DOMINANT MICROFLORA OF THE NASAL CAVITY IN CHILDREN WITH SINUSITIS

S.A.Levytska

Abstract. The investigation of the studied species composition and population level of the luminal microflora of the middle nasal meatuses was done in 252 children with acute and chronic purulent sinusitis. The typology of dominants and direction of micro-ecology changes of the nasal cavity in the formation of foci of chronic inflammation were established. It has been found that acute purulent sinusitis develops in case of the absence of dominants in microbiocenosis. The absolute dominant microflora in chronic sinusitis is *Staphylococcus aureus*.

Key words: acute and chronic sinusitis, microbiocenosis.

Bukovyna State Medical University

Clin. and experim. pathol.- 2013.- Vol.12, №4 (46).-P.72-74.

Надійшла до редакції 01.12.2013

Рецензент – проф. О. В. Кравченко