

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВІЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
HIGHER STATE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF UKRAINE
"BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY"

Індексований у міжнародних наукометрических базах:

Academy (Google Scholar)
Ukrainian Research&Academy Network
(URAN)
Academic Resource Index Research Bib

Index Copernicus International
Scientific Indexing Services
Включений до Ulrichswebtm Global Serials
Directory

**KLINICHNA TA
EKSPERIMENTAL'NA
PATOLOGIYA**

**CLINICAL & EXPERIMENTAL
PATHOLOGY**

На всі статті, опубліковані в журналі «Клінічна та експериментальна патологія»,
встановлюються цифрові ідентифікатори DOI

T. XVIII, №4 (70), 2019

**Щоквартальний український
науково- медичний журнал.
Заснований у квітні 2002 року**

**Свідоцтво про державну реєстрацію
Серія КВ №6032 від 05.04.2002 р.**

Засновник і видавець: Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Головний редактор

В. Ф. Мислицький

Перший заступник головного редактора

С. С. Ткачук

Відповідальні секретарі:

С. Є. Дайнека

О. С. Хухліна

Секретар

Г. М. Лапа

Наукові редактори випуску:

д. мед. н., проф. В.М. Пашковський

д. мед. н., проф. О.І. Федів

д. мед. н., проф. Т.В. Сорокман

Редакційна колегія:

Булик Р.Є.

Власик Л.І.

Денисенко О.І.

Іващук О.І.

Ілашук Т.О.

Колоскова О.К.

Коновчук В.М.

Масікевич Ю.Г.

Пашковський В.М.

Полянський І.Ю.

Сорокман Т.В.

Федів О.І.

Цигикало О.В.

Адреса редакції: 58002, Чернівці, пл. Театральна, 2, видавничий відділ БДМУ

Тел./факс: (0372) 553754. **E-mail** lapagalina46@gmail.com

Повнотекстова версія журналу представлена на сайті <http://www.bsmu.edu.ua/files/KEP/>

Електронні копії опублікованих статей передаються до **Національної бібліотеки**

ім. В.І. Вернадського для вільного доступу в режимі on-line

Реферати статей публікуються в "**Українському реферативному журналі**", серія "Медицина"

Редакційна рада:

проф. А.В. Абрамов (Запоріжжя, Україна); проф. Е.М. Алієва (Баку, Азербайджан); проф. А.І. Березнякова (Харків, Україна); проф. В.В. Братусь (Київ, Україна); проф. І.М. Катеренюк (Кишинів, Республіка Молдова); проф. Ю.М. Колесник (Запоріжжя, Україна); акад. АН ВШ України, проф. С.С. Костишин; чл.-кор. АМН України, проф. В.А. Міхньов (Київ, Україна); чл.-кор. НАМН України, проф. М.Г. Проданчук; акад. АМН, чл.-кор. НАН України, О.Г. Резніков (Київ, Україна); чл.-кор. НАН України, проф. В.Ф. Сагач (Київ, Україна); чл.-кор. НАН України, проф. Р.С. Стойка (Львів, Україна); акад. НАМН, чл.-кор. НАН України М.Д. Тронько; проф. В.В. Чоп'як (Львів, Україна); проф. В.О. Шидловський (Тернопіль, Україна); проф. В. О. Шумаков (Київ, Україна).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р., № 975
журнал "Клінічна та експериментальна патологія" включено до переліку
наукових фахових видань України, категорія Б

Рекомендовано до друку та поширення через Інтернет рішенням вченої ради вищого
державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний
університет (протокол № 4 від 28.11.2019 р.)

Матеріали друкуються українською,
російською та англійською мовами

Рукописи рецензуються. Редколегія
залишає за собою право редактування.

Передрук можливий за письмової згоди
редколегії.

Комп'ютерний набір і верстка -
М.П. Мотрук
Наукове редактування - редакції

Редактування англійського тексту - Г.М. Лапи

Коректор - І.В. Зінченко

Група технічно-інформаційного забезпечення:
І.Б. Горбатюк
Л.І. Сидорчук
В.Д. Сорохан

ISSN 1727-4338
DOI 10.24061/1727-4338.XVIII.4.70.2019

© "Клінічна та експериментальна
патологія" (Клін. та експерим.
патол.), 2019

© "Клиническая и
экспериментальная патология"
(Клин. и эксперим. патол.), 2019

© Clinical and experimental pathology (Clin.
and experim. pathol.), 2019
Founded in 2002
Publishing four issues a year

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ, СЕЛЕЗІНКИ ТА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗА УМОВ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ОСТАННЬОГО

O.V. Tkachuk, S.S. Tkachuk, M.A. Povar, V.I. Shtefaniuk

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" м.Чернівці

Клінічна та
експериментальна
патологія Т.18, №4
(70). С.120-126.

DOI:10.24061/1727-
4338.XVIII.4.70.2019.302

E-mail: physiology@
bsmu.edu.ua

Мета роботи - проаналізувати дані літератури стосовно взаємозв'язків між ішемічно-реперфузійними пошкодженнями головного мозку та морфофункциональним станом печінки і селезінки.

Висновок. Аналіз наявних у літературі наукових фактів переконливо доводить наявність двобічних взаємозв'язків між ішемічно-реперфузійним ушкодженням головного мозку та морфофункциональним станом печінки і селезінки.

Ключові слова: церебральна ішемія-реперфузія, печінка, селезінка.

Клиническая и
экспериментальная
патология Т.18, №4
(70). С.120-126.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ВЗАИМОСВЯЗИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ, СЕЛЕЗЕНКИ И ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ ПОСЛЕДНЕГО

A.V. Tkachuk, S.S. Tkachuk, M.A. Povar, V.I. Shtefaniuk

Цель работы - проанализировать данные литературы касательно взаимосвязей между ишемически-реперфузионным повреждением головного мозга и морфофункциональным состоянием печени и селезенки.

Выход. Анализ имеющихся в литературе научных фактов убедительно доказывает наличие двусторонних взаимосвязей между ишемически-реперфузионным повреждением головного мозга и морфофункциональным состоянием печени и селезенки.

Ключевые слова: церебральная ишемия-реперфузия, печень, селезенка.

Clinical and
experimental
pathology. Vol.18,
№4 (70). P.120-126.

MODERN VIEWS ON INTERDEPENDENCE OF MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LIVER, SPLEEN AND BRAIN UNDER CONDITIONS OF ISCHEMIA-REPERFUSION OF THE BRAIN

O.V. Tkachuk, S.S. Tkachuk, M.A. Povar, V.I. Shtefaniuk

Objective - to analyze the literature data concerning correlations between ischemic-reperfusion brain damages and morphofunctional state of the liver and spleen.

Conclusion. The analysis of the scientific facts available in the literature convincingly demonstrates the presence of the duplex correlations between ischemic-reperfusion brain damage and morphofunctional state of the liver and spleen.

Key words: cerebral ischemia-reperfusion, liver, spleen.

Вступ

За даними літератури навіть нетривалі гіпоксичні стани головного мозку призводять до суттєвих патогістологічних змін у печінці та селезінці, які стають причиною порушення їх функціонального стану, імунного статусу і, у свою чергу, обтяжують перебіг основного захворювання. Протягом останніх років накопичено достатньо кількість наукових фактів щодо характеру взаємозв'язків між морфофункциональним станом печінки, селезінки й інших внутрішніх органів та головним мозком за умов його ішемічно-реперфузійного ушкодження.

Мета роботи

Проаналізувати дані літератури стосовно взаємозв'язків між ішемічно-реперфузійними пошкодженнями головного мозку та морфофункциональним станом печінки і селезінки.

Основна частина

Продемонстровано, що дисфункція печінки відноситься до основних системних ускладнень гострих пошкоджень мозкового кровообігу (ГПМК), а її розвиток пов'язаний із підвищеннем ризику летального наслідку та погіршенням прогнозу - смертність серед таких хворих становить 40,3 % [1]. Ішемія-реперфузія головного мозку призводить до пошкодження та дисфункції печінки внаслідок надмірного накопичення активних форм кисню [1], енергетичного дефіциту та активації апоптозу [2] і запальної реакції [3].

У щурів з ішемією-реперфузією головного мозку виявлена посилена індукція цитохрому P450 2E1 (CYP2E1), збільшення вмісту TNF- α , IL-1 в сироватці крові, малонового альдегіду (МА) - в мітохондріальній фракції печінки та зниження в печінці активності СОД і ГПО [4]. Відповідно до змін МДА також виявлено збільшення мітохондріального вмісту Ca²⁺, що є пато-

генетичною ланкою пошкодження гепатоцитів, оскільки перевантаження мітохондрій і клітин у цілому цим іоном посилює ПОЛ і призводить до зниження окиснювального фосфорилування в мітохондріях із подальшим пошкодженням їх структури та функції і зниженням синтезу АТФ. З іншого боку, ПОЛ, у свою чергу, посилює перевантаження Ca^{2+} , діючи на структуру мембрани [4]. Отже, перевантаження мітохондрій гепатоцитів Ca^{2+} тісно пов'язане з ПОЛ, і разом цим чинникам належить важлива роль у пошкодженні печінки після ішемії-реперфузії головного мозку.

Взаємозв'язок ішемічного ушкодження мозку та дисфункції печінки продемонстровано також дослідженнями інших авторів [5], які показали, що в щурів після ішемії-реперфузії головного мозку активність ксантиноксидази, АЛТ, АСТ, рівень NO у сироватці крові та рівень NO і МДА в печінці були підвищені. Активність СОД та ГПО в цитозольній фракції суттєво змешувалася. Крім того, після ішемії-реперфузії головного мозку в печінці щурів було виявлено втрату активності CYP3A, але не було змін в активності CYP1A1, CYP1A2 та CYP2E1, що демонструє пошкодження клітин печінки за цих умов переважно за рахунок зниження антиоксидантної активності.

Одним із шляхів реагування печінки на ішемію-реперфузію головного мозку вважається посилення синтезу печінкою ферментів, причетних до метаболізму токсичного глутамату, який, як відомо, у надмірних кількостях утворюється в ішемізованій зоні внаслідок активації глутаматного каскаду [6, 7].

Спостереження в динаміці ішемічного інсульту показали, що протягом першого тижня активність глутаматоксалоацетаттрансферази (ГОТ), глутамат-піруваттрансамінази (ГПТ), γ -глутамілтрансферази (γ -ГТ) та вміст СРБ зростали з наступним виходом на плато, а рівні некон'югованого білірубіну, еритроцитів та гемоглобіну достовірно знижувалися [8]. Встановлено також тісні кореляційні зв'язки між розміром зони інфаркту мозку та вмістом СРБ, лейкоцитів, ГОТ, γ ГТ і прямим білірубіном. Зростання СРБ, лейкоцитів і γ ГТ і зменшення гемоглобіну та некон'югованого білірубіну розцінюються як результат запалення, а збільшення рівнів ГОТ і ГПТ, на думку авторів, опосередковується сигнальним шляхом, незалежним від запалення [8]. Отже, печінка бере участь у гострій фазі ішемічного інсульту, виробляючи ферменти у відповідь на сигнали, що надходять від пошкодженої тканини мозку, причому їх виділення пропорційне розмірам пошкодження. Вважають, що вироблення реагентів гострої фази, таких як СРБ і γ ГТ, спричиняють прозапальні цитокіни, а токсичний глутамат викликає синтез ГОТ і ГПТ. Кореляційний аналіз показав, що ГОТ є єдиним ферментом печінки, який безпосередньо пов'язаний з ішемічним пошкодженням мозку незалежно від запалення. Вважають, що цей фермент, який нейтралізує токсичний глутамат, може відігравати нейропротекторну роль при ішемічному пошкодженні і має сприятливе прогностичне значення [8, 9].

Сьогодні увагу дослідників привертає наявність у печінці захисних механізмів, які швидко реагують на

механічні та хімічні пошкоджувальні впливи, а також високий регенераторний потенціал гепатоцитів, біліарних епітеліальних, ендотеліальних клітин, клітин Купфера та Іто [10-12]. Однак печінка здатна ініціювати не лише механізми самозахисту, але й нейропротекторні антиишемічні [13], одним з яких при ішемії-реперфузії мозку є посилення продукція трифоїлового пептиду (TFF3) [14]. За умов генетично обумовленого його дефіциту в миші зростає зона ішемічного ушкодження мозку та поглиблюється неврологічний дефіцит, а введення рекомбінантного TFF3 таким мишам усуває ці ускладнення. Надходження TFF3 у системний кровообіг і через порушений ГЕБ у мозок послаблює активність каспази 3 - пускового чинника апоптозу нейронів, що свідчить про залучення пригнічення каспазного шляху до механізмів нейропротекторної дії цього пептиду [15]. Даний чинник зменшує частоту та розміри інфарктів мозку та неврологічний дефіцит, ступінь дезорганізації мікротрубочкових білків 2 в ушкоджених ішемією-реперфузією нейронах [14]. Вважають, що посилення експресії TFF3 в печінці при ішемії-реперфузії головного мозку відбувається під впливом рекрутованих у мозок лейкоцитів, медіаторів запалення, що вивільнюються з ішемізованої тканини та активуються гліальними клітинами. Взаємодіючи зі своїми рецепторами в пошкоджених нейронах TFF3 активує мережі сигнальних факторів, що здійснюють нейрозахист.

Про тісний взаємозв'язок стану печінки та головного мозку свідчать показники ушкодження печінки при загибелі мозку. Встановлено, що в механізмах ураження печінки за таких умов важлива роль на ранніх стадіях належить автономній денервациї, гемодинамічним пошкодженням, а в подальшому - активації прозапальних чинників. Активація клітин Купфера, наслідком якої є ампліфікація TNF- α , TLR4 та надмірна продукція прозапальних цитокінів, таких як IL-1 β , IL-6, IL-10, TNF- β та MIP-1 α , призводить до фіброзу і пошкодження печінки [16].

Однак не лише ішемічно-реперфузійні ушкодження головного мозку можуть впливати на показники морфофункционального стану печінки, але й ішемія-реперфузія печінки здатна впливати на активність окремих нейрональних фенотипів у мозку щурів. Перетискання печінкової артерії або порталової тріади (печінкова артерія, портална вена, загальна жовчна протока) за показниками експресії гена раннього реагування C-Fos-впливає на активність нейронів катехоламінергічних структур мозку, субфоретичного органа, аркуатного, супрахіазматичного, паравентрикулярного, супраоптичного та вентромедіального гіпоталамічних ядер, нейронів locus coeruleus, ядра одиночного тракту, а також групи катехоламінергічних клітин A1 / C1 [17]. Таке збільшення активності нейронів розцінюється, принаймні частково, як результат пошкодження печінки. Подаліші дослідження з визначенням нейросекретів окремих ядер або ж ферментів обміну катехоламінів підтвердили цю точку зору. Показано, що збільшення кількості C-Fos-позитивних клітин у переважній кількості досліджених структур мозку відбулося через 90 хв після реперфузії печінки. При цьому визначалася

посилена експресія вазопресину і окситоцину в сомі нейронів паравентрикулярних і супраоптичних ядер гіпоталамуса, а тирозингідроксилази, нейропептиду Y та фенілэтаноламін-N-метилтрансферази - в перикаріонах катехоламінергічної вентролатеральної ділянки довгастого мозку [18]. Отже, ішемія-реперфузія печінки активує функціонально різні типи нейронів.

Селезінка належить до лімфоїдних органів із найбільший пулом імунологічних клітин, тому зрозуміло, що після ішемії-реперфузії головного мозку останні спрямовуються до ділянок запалення в ушкоджених тканинах мозку [19-21]. Активація селезінки за цих умов відбувається за участі симпатичної нервової системи [84]. Підвищення тонусу симпато-адреналової системи після оклюзії середньомозкової артерії (ОСМА) забезпечує зростання в селезінці та системному кровообігу рівнів катехоламінів, які діють через α_1 - і β -адренорецептори селезінки. Дослідження на самцях щурів із денервацією селезінки за 2 тижні до ОСМА та тих, які отримували блокатори α_1 - та β -рецепторів продемонстрували участь обох типів адренорецепторів у регуляції відповіді селезінки на ішемічне ушкодження мозку [22, 23].

Іншим проявом активації селезінки після ішемії мозку є продукція активованих прозапальних цитокінів, хемокінів та їх рецепторів, які проникають через пошкоджений ГЕБ і поглиблюють постішемічні зміни в нервовій тканині [24, 25]. Крім того, селезінка бере участь в активації автоімунної реакції на пошкоджені тканини мозку, що набувають антигенних властивостей [26, 27].

Підтвердженням ролі селезінки в механізмах ішемічно-реперфузійного ушкодження нервової тканини є дослідження, які демонструють, що спленектомія перед моделюванням ішемії зменшує реакцію імунної системи на пошкодження головного мозку, ступінь нейродегенерації та обсяг зони інфаркту, знижує активацію мікроглії, кількість макрофагів та нейтрофілів у тканинах мозку [28-30].

Порушення мормофункционального стану селезінки шляхом опромінення до моделювання ішемії мозку або протягом перших 3-4-х годин постішемічного періоду знижує рівні лімфоцитів у крові після ОСМА, обсяг зони некрозу, вимірюні через 48 годин і 7 днів відповідно. На 7-й день постішемічного періоду в опромінених щурів зменшується відсоток мікроглії, проникнення T-клітин у мозок та апоптоз нейронів порівняно з тваринами без опромінення [19]. Встановлена кореляція між масою селезінки та кількістю лімфоцитів, що надходять до ішемізованого мозку, а також негативна кореляція між масою селезінки та кількістю в ній апоптичних клітин: після опромінення селезінки в мозку зменшувалася не лише зона некрозу, але й кількість нейро- та астроцитів з ознаками апоптозу.

Сplenектомія, виконана в більш пізні терміни після МСАО, призводила до тривалого зниження відсотка CD3+CD4+ і CD3+CD8+ T-клітин та підвищення відсотка В-клітин із фенотипом CD3-CD45RA+, внаслідок чого співвідношення T / В-клітин у цій групі достовірно зменшилося, що спричиняло втрату нейрозахисного ефекту, досягнутого ранією спленектомією після

інсульту [31].

У свою чергу, у тварин з експериментальними інсультами селезінка зазнає суттєвих змін. У щурів після тривалої ОСМА розміри селезінки тимчасово зменшувалися з максимумом через 48 годин і поверненням до норми на 72 годину. Саме під час скорочення селезінки під впливом підвищеної рівня катехоламінів спленоцити виділялися в системний кровообіг і мігрували до пошкодженої півкулі мозку. Спленоцити, що забезпечують вроджений імунітет, були знайдені в мозку через 48 годин, а ті, що відповідають за адаптивний - через 96 годин після ішемії [32]. Як правило, спостерігається негативна кореляція між розміром селезінки та об'ємом інфаркту [19, 33].

У мишей в постішемічному періоді також виявлено зменшення кількості клітин і розміру селезінки після ОСМА. Однак ці зміни носили довготривалий характер, який пояснюють апоптозом спленоцитів та структурними змінами селезінки, включаючи фолікули, що містять В-клітини. Через 96 годин після ОСМА кількість спленоцитів у мишей зменшувалася на 90 % порівняно з псевдооперованими мишами за рахунок В-клітин, а кількість Т-клітин, особливо регуляторних Т-клітин, зростала [33]. Пізніше було показано, що розміри селезінки мишей продовжували зменшуватися навіть на 7-й день після ОСМА [34]. На відміну від щурів, у мишей селезінка не скорочується, незважаючи на наявність в її капсулі α_1 -адренорецепторів, проте імунні клітини селезінки мають катехоламінергічну іннервацію, яка при масивній стимуляції негативно впливає на деякі з цих клітин, що призводить до їх загибелі [35] і стає причиною зменшення розмірів органу.

Ультразвукове дослідження селезінки в пацієнтів з ішемічним інсультом показало, що її розмір в ранньому постінсультному періоді зменшувався, а потім починав відновлюватися [36]. В іншому дослідженні на підставі КТ-сканування, в пацієнтів з ішемічним та геморагічним інсультом було показано, що селезінка зазнає двофазної реакції на інсульт із тимчасовим зменшенням розміру, який досягає свого мінімуму через 48 год, та поступовим поверненням до нормальних розмірів до 5-ї доби постішемічного періоду [37]. Однак у пацієнтів, стан яких погіршувався, селезінка продовжувала зменшуватися.

Нейропротекторна роль спленектомії зберігається і в людей та тварин похилого віку, для яких характерні вікові зміни імунної системи, відновлення після інсультів є більш проблематичним, а смертність - вищою порівняно з особами молодого віку [38].

У новонароджених щурів також продемонстровано захисну роль спленектомії [39]. Видалення селезінки достовірно зменшувало об'єм інфаркту мозку через 72 години після ішемії/гіпоксії, втрату маси тіла, атрофію мозку та периферичних органів і неврологічний дефіцит через 3 тижні спостереження.

Ці дослідження переконливо демонструють, що селезінка ініціює імунні реакції, які посилюють ішемічне ушкодження мозку.

У тварин з експериментальними інсультами встановлена наявність сильних кореляційних зв'язків між

післяінсультною активацією імунної системи та змінами селезінки [20, 24, 40], які проявлялися зменшенням числа апоптичних клітин на тлі збільшення їх некрозу, змінами фенотипу спленоцитів та атрофією селезінки [24, 25, 27, 40-43]. Характерно, що в пацієнтів зі зменшенням розмірів селезінки були достовірно підвищені профілі INF γ , IL-6, IL-10, IL-12 та IL-13 [30]. Було помічено, що при нейродегенеративних змінах у тварин з експериментальними інсультами одним з основних медіаторів, які продукує селезінка, є INF γ [30, 44]. Лімфоцити, що вивільнюються селезінкою при ішемічному інсулті, зачуті у розвиток нейrozапалення, тромбозу та неврологічних порушень [21], а IFN γ посилює реакцію селезінки, а відтак - наслідки ОСМА. Одним із механізмів такого посилення є активація під впливом IFN γ експресії запального хемокіну - білка 10 (IP-10) [24]. Показано, що після фокальної ішемії експресія цього білка зростає як у мозку, так і в селезінці, а спленектомія пригнічує зростання IP-10 в мозку. Уведення рекомбінантного IFN γ спленектомованим шурам повертало вміст IP-10 у мозку до постішемічного рівня. Роль цього цитокіну в механізмах лімфоцитарної інфільтрації мозку при його ішемії була підтверджена дослідами з уведенням антитіл до IFN γ , внаслідок чого Т-клітинна інфільтрація в ділянці ішемії зменшувалася [25, 44].

Відомий фактор поглиблення постішемічних змін у мозку - рекрутування моноцитів до зони ішемії - співвідноситься зі змінами їх кількості в селезінці: в гострому періоді інсульту вміст про- і протизапальних моноцитів у селезінці знижується, а в мозку - зростає [45], при цьому спленектомія, виконана до моделювання ОСМА, зменшує ступінь інфільтрації нервової тканини [46].

Висновок

Сукупність цих фактів переконливо доводить наявність тісних взаємозв'язків між ішемічно-реперфузійним ушкодженням головного мозку та морфофункциональним станом печінки і селезінки.

Список літератури:

- Niu WM, Liu ZB, Yang XH, Wang Y, Shi HL. Effect on CATmRNA expression in cerebral ischemia reperfusion rat with hepatic injury treated by protecting liver to nourish brain therapy. *Liaoning J Tradit Chin Med.* 2013;40:342-4.
- Zhao W, Li FJ, Wang S. Protective effects of chrysophanol on liver injury induced by cerebral ischemia-reperfusion in mice. *Acta Neuropharmacol.* 2014;4:1-9.
- Zhong WH, Qian KJ, Xiong JB, Ma K, Wang AZ, Zou Y. Curcumin alleviates lipopolysaccharide induced sepsis and liver failure by suppression of oxidative stress-related inflammation via PI3K/AKT and NF-?B related signaling. *Biomed Pharmacother.* 2016;83:302-13. doi: 10.1016/j.biopha.2016.06.036
- Lin MS, Miao HL, Gong XG, Bao ST. Effect of L-arginine on calcium in hepatic mitochondrion in rats with obstructive jaundice. *Hepatobiliary Pancreat Dis Int.* 2006;5(3):432-5.
- Yang XF, He W, Lu WH, Zeng FD. Effects of scutellarin on liver function after brain ischemia/reperfusion in rats. *Acta Pharmacol Sin.* 2003;24(11):1118-24.
- Chen J, Li Z, Hatcher JT, Chen QH, Chen L, Wurster RD, et al. Deletion of TRPC6 Attenuates NMDA Receptor-Mediated Ca²⁺ Entry and Ca²⁺-Induced Neurotoxicity Following Cerebral Ischemia and Oxygen-Glucose Deprivation. *Front Neurosci [Internet].* 2017[cited 2019 Jan 19];11:138. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5368256/pdf/fnins-11-00138.pdf>
- doi: 10.3389/fnins.2017.00138
- You J, Feng L, Xin M, Ma D, Feng J. Cerebral Ischemic Postconditioning Plays a Neuroprotective Role through Regulation of Central and Peripheral Glutamate. *Biomed Res Int [Internet].* 2018[cited 2019 Feb 11];2018:6316059. Available from: <https://www.hindawi.com/journals/bmri/2018/6316059/> doi: 10.1155/2018/6316059
- Campos F, Rodríguez-Yáñez M, Castellanos M, Arias S, Pérez-Mato M, Sobrino T, et al. Blood levels of glutamate oxaloacetate transaminase are more strongly associated with good outcome in acute ischaemic stroke than glutamate pyruvate transaminase levels. *Clin Sci (Lond).* 2011;121(1):11-7. doi: 10.1042/CS20100427
- Campos F, Sobrino T, Ramos-Cabrer P, Castellanos M, Blanco M, Rodríguez-Yáñez M, et al. High blood glutamate oxaloacetate transaminase levels are associated with good functional outcome in acute ischemic stroke. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2011;31(6):1387-93. doi: 10.1038/jcbfm.2011.4
- Riehle KJ, Dan YY, Campbell JS, Fausto N. New concepts in liver regeneration. *J Gastroenterol Hepatol.* 2011;26(Suppl 1):203-12. doi: 10.1111/j.1440-1746.2010.06539.x
- Zhou W, Chen X, Zhao G, Xu D, Jiang Z, Zhang L, et al. Psoralen Induced Liver Injury by Attenuating Liver Regenerative Capability. *Front Pharmacol [Internet].* 2018[cited 2019 Feb 11];9:1179. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232894/pdf/fphar-09-01179.pdf> doi: 10.3389/fphar.2018.01179
- Böhm F, Köhler UA, Speicher T, Werner S. Regulation of liver regeneration by growth factors and cytokines. *EMBO Mol Med.* 2010;2(8):294-305. doi: 10.1002/emmm.201000085
- Liu SQ, Tefft BJ, Roberts DT, Zhang LQ, Ren Y, Li YC, et al. Cardioprotective proteins upregulated in the liver in response to experimental myocardial ischemia. *Am J Physiol Heart Circ Physiol [Internet].* 2012[cited 2019 Jan 17];303(12):H1446-58. Available from: <https://www.physiology.org/doi/pdf/10.1152/ajpheart.00362.2012> doi: 10.1152/ajpheart.00362.2012
- Liu SQ, Roberts D, Zhang B, Ren Y, Zhang LQ, Wu YH. Trefoil factor 3 as an endocrine neuroprotective factor from the liver in experimental cerebral ischemia/reperfusion injury. *PLoS One [Internet].* 2013[cited 2019 Jan 17];8(10):e77732. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799633/pdf/pone.0077732.pdf> doi: 10.1371/journal.pone.0077732
- Aboutaleb N, Shamsaei N, Rajabi H, Khaksari M, Erfani S, Nikbakht F, et al. Protection of Hippocampal CA1 Neurons Against Ischemia/Reperfusion Injury by Exercise Preconditioning via Modulation of Bax/Bcl-2 Ratio and Prevention of Caspase-3 Activation. *Basic Clin Neurosci.* 2016;7(1):21-9.
- Dziodzio T, Biebl M, Pratschke J. Impact of brain death on ischemia/reperfusion injury in liver transplantation. *Curr Opin Organ Transplant.* 2014;19(2):108-14. doi: 10.1097/MOT.000000000000061
- Pirnik Z, Bundzikova J, Francisty T, Cibulova E, Lackovicova L, Mravec B, et al. Effect of liver ischemia-reperfusion injury on the activity of neurons in the rat brain. *Cell Mol Neurobiol.* 2009;29(6-7):951-60. doi: 10.1007/s10571-009-9381-7
- Bundzikova J, Pirnik Z, Lackovicova L, Mravec B, Kiss A. Activation of Different Neuronal Phenotypes in the Rat Brain Induced by Liver Ischemia-Reperfusion Injury: Dual Fos/Neuropeptide Immunohistochemistry. *Cell Mol Neurobiol.* 2011;31(2):293-301. doi: 10.1007/s10571-010-9621-x
- Ostrowski RP, Schulte RW, Nie Y, Ling T, Lee T, Manaenko A, et al. Acute splenic irradiation reduces brain injury in the rat focal ischemic stroke model. *Transl Stroke Res.* 2012;3(4):473-81. doi: 10.1007/s12975-012-0206-5
- Offner H, Vandebark AA, Hurn PD. Effect of experimental stroke on peripheral immunity: CNS ischemia induces profound immunosuppression. *Neuroscience.* 2009;158(3):1098-111. doi: 10.1016/j.neuroscience.2008.05.033
- Marcet P, Santos N, Borlongan CV. When friend turns foe: central and peripheral neuroinflammation in central nervous system injury. *Neuroimmunol Neuroinflamm.* 2017; 4:82-92. doi: 10.20517/2347-8659.2017.07
- Ajmo CT Jr, Collier LA, Leonardo CC, Hall AA, Green SM, Womble TA, et al. Blockade of adrenoreceptors inhibits the splenic

- response to stroke. *Exp Neurol.* 2009;218(1):47-55. doi: 10.1016/j.expneurol.2009.03.044
23. Rasouli J, Lekhraj R, Ozbalik M, Lalezari P, Casper D. Brain-spleen inflammatory coupling: a literature review. *Einstein J Biol Med.* 2011;27(2):74-7. doi: 10.23861/EJBM20112768
24. Offner H, Subramanian S, Parker SM, Afentoulis ME, Vandenberg AA, Hurn PD. Experimental stroke induces massive, rapid activation of the peripheral immune system. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2006;26(5):654-65. doi: 10.1038/sj.jcbfm.9600217
25. Seifert HA, Leonardo CC, Hall AA, Rowe DD, Collier LA, Benkovic SA, et al. The spleen contributes to stroke induced neurodegeneration through interferon gamma signaling. *Metab Brain Dis.* 2012;27(2):131-41. doi: 10.1007/s11011-012-9283-0
26. Черных ЕР, Шевела ЕЯ, Морозов СА, Останин АА. Имунопатогенетические аспекты ишемического инсульта. *Медицинская иммунология.* 2018;20(1):19-34.
27. Planas AM, Gomez-Choco M, Urrea X, Gorina R, Caballero M, Chamorro A. Brain-derived antigens in lymphoid tissue of patients with acute stroke. *J Immunol.* 2012;188(5):2156-63. doi: 10.4049/jimmunol.1102289
28. Dotson AL, Wang J, Saugstad J, Murphy SJ, Offner H. Splenectomy reduces infarct volume and neuroinflammation in male but not female mice in experimental stroke. *J Neuroimmunol.* 2015;278:289-98. doi: 10.1016/j.jneuroim.2014.11.020
29. Zhang BJ, Men XJ, Lu ZQ, Li HY, Qiu W, Hu XQ. Splenectomy protects experimental rats from cerebral damage after stroke due to anti-inflammatory effects. *Chin Med J (Engl).* 2013;126(12):2354-60.
30. Vahidy FS, Parsha KN, Rahbar MH, Lee M, Bui TT, Nguyen C, et al. Acute splenic responses in patients with ischemic stroke and intracerebral hemorrhage. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2016;36(6):1012-21. doi: 10.1177/0271678X15607880
31. Ran Y, Liu Z, Huang S, Shen J, Li F, Zhang W, et al. Splenectomy Fails to Provide Long-Term Protection Against Ischemic Stroke. *Aging Dis.* 2018;9(3):467-9. doi: 10.14336/AD.2018.0130
32. Seifert HA, Hall AA, Chapman CB, Collier LA, Willing AE, Pennypacker KR. A transient decrease in spleen size following stroke corresponds to splenocyte release into systemic circulation. *J Neuroimmune Pharmacol.* 2012;7(4):1017-24. doi: 10.1007/s11481-012-9406-8
33. Offner H, Subramanian S, Parker SM, Wang C, Afentoulis ME, Lewis A, et al. Splenic atrophy in experimental stroke is accompanied by increased regulatory T cells and circulating macrophages. *J Immunol.* 2006;176(11):6523-31.
34. Bao Y, Kim E, Bhosle S, Mehta H, Cho S. A role for spleen monocytes in post-ischemic brain inflammation and injury. *J Neuroinflammation [Internet].* 2010[cited 2019 Jan 20];7:92. Available from: <https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1742-2094-7-92> doi: 10.1186/1742-2094-7-92
35. Grisanti LA, Perez DM, Porter JE. Modulation of immune cell function by alpha(1)-adrenergic receptor activation. *Curr Top Membr.* 2011;67:113-38. doi: 10.1016/B978-0-12-384921-2.00006-9
36. Chiu NL, Kaiser B, Nguyen YV, Welbourne S, Lall C, Cramer CC. The volume of the spleen and its correlates after acute stroke. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2016;25(12):2958-61. doi: 10.1016/j.strokecerebrovasdis.2016.08.012
37. Famakin BM. The immune response to acute focal cerebral ischemia and associated post-stroke immunodepression: a focused review. *Aging Dis.* 2014;5(5):307-26. doi: 10.14336/AD.2014.0500307
38. Chauhan A, Al Mamun A, Spiegel G, Harris N, Zhu L, McCullough LD. Splenectomy protects aged mice from injury after experimental stroke. *Neurobiol Aging.* 2018;61:102-11. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2017.09.022
39. Fathali N, Ostrowski RP, Hasegawa Y, Lekic T, Tang J, Zhang JH. Splenic immune cells in experimental neonatal hypoxia-ischemia. *Transl Stroke Res.* 2013;4(2):208-19. doi: 10.1007/s12975-012-0239-9
40. Pennypacker KR, Offner H. The role of the spleen in ischemic stroke. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2015;35(2):186-7. doi: 10.1038/jcbfm.2014.212
41. Wang Z, He D, Zeng YY, Zhu L, Yang C, Lu YJ, et al. The spleen may be an important target of stem cell therapy for stroke. *J Neuroinflammation [Internet].* 2019[cited 2019 Feb 27];16(1):20. Available from: <https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12974-019-1400-0> doi: 10.1186/s12974-019-1400-0
42. Vendrame M, Gemma C, Pennypacker KR, Bickford PC, Davis Sanberg C, Sanberg PR, et al. Cord blood rescues stroke-induced changes in splenocyte phenotype and function. *Exp Neurol.* 2006;199:191-200. doi: 10.1016/j.expneurol.2006.03.017
43. Liu ZJ, Chen C, Li FW, Shen JM, Yang YY, Leak RK, et al. Splenic responses in ischemic stroke: new insights into stroke pathology. *CNS Neurosci Ther.* 2015;21(4):320-6. doi: 10.1111/cns.12361
44. Seifert HA, Collier LA, Chapman CB, Benkovic SA, Willing AE, Pennypacker KR. Pro-inflammatory interferon gamma signaling is directly associated with stroke induced neurodegeneration. *J Neuroimmune Pharmacol.* 2014;9(5):679-89. doi: 10.1007/s11481-014-9560-2
45. McCulloch L, Alfieri A, McColl BW. Experimental Stroke Differentially Affects Discrete Subpopulations of Splenic Macrophages. *Front Immunol [Internet].* 2018[cited 2019 Feb 14];9:1108. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5972287/pdf/fimmu-09-01108.pdf> doi: 10.3389/fimmu.2018.01108
46. Kim E, Yang J, Beltran CD, Cho S. Role of spleen-derived monocytes/macrophages in acute ischemic brain injury. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2014;34(8):1411-9. doi: 10.1038/jcbfm.2014.101

References:

1. Niu WM, Liu ZB, Yang XH, Wang Y, Shi HL. Effect on CATmRNA expression in cerebral ischemia reperfusion rat with hepatic injury treated by protecting liver to nourish brain therapy. *Liaoning J Tradit Chin Med.* 2013;40:342-4.
2. Zhao W, Li FJ, Wang S. Protective effects of chrysophanol on liver injury induced by cerebral ischemia-reperfusion in mice. *Acta Neuropharmacol.* 2014;4:1-9.
3. Zhong WH, Qian KJ, Xiong JB, Ma K, Wang AZ, Zou Y. Curcumin alleviates lipopolysaccharide induced sepsis and liver failure by suppression of oxidative stress-related inflammation via PI3K/AKT and NF-?B related signaling. *Biomed Pharmacother.* 2016;83:302-13. doi: 10.1016/j.biopha.2016.06.036
4. Lin MS, Miao HL, Gong XC, Bao ST. Effect of L-arginine on calcium in hepatic mitochondrion in rats with obstructive jaundice. *Hepatobiliary Pancreat Dis Int.* 2006;5(3):432-5.
5. Yang XF, He W, Lu WH, Zeng FD. Effects of scutellarin on liver function after brain ischemia/reperfusion in rats. *Acta Pharmacol Sin.* 2003;24(11):1118-24.
6. Chen J, Li Z, Hatcher JT, Chen QH, Chen L, Wurster RD, et al. Deletion of TRPC6 Attenuates NMDA Receptor-Mediated Ca²⁺ Entry and Ca²⁺-Induced Neurotoxicity Following Cerebral Ischemia and Oxygen-Glucose Deprivation. *Front Neurosci [Internet].* 2017[cited 2019 Jan 19];11:138. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5368256/pdf/fnins-11-00138.pdf> doi: 10.3389/fnins.2017.00138
7. You J, Feng L, Xin M, Ma D, Feng J. Cerebral Ischemic Postconditioning Plays a Neuroprotective Role through Regulation of Central and Peripheral Glutamate. *Biomed Res Int [Internet].* 2018[cited 2019 Feb 11];2018:6316059. Available from: <https://www.hindawi.com/journals/bmri/2018/6316059/> doi: 10.1155/2018/6316059
8. Campos F, Rodríguez-Yáñez M, Castellanos M, Arias S, Pérez-Mato M, Sobrino T, et al. Blood levels of glutamate oxaloacetate transaminase are more strongly associated with good outcome in acute ischaemic stroke than glutamate pyruvate transaminase levels. *Clin Sci (Lond).* 2011;121(1):11-7. doi: 10.1042/CS20100427
9. Campos F, Sobrino T, Ramos-Cabrera P, Castellanos M, Blanco M, Rodríguez-Yáñez M, et al. High blood glutamate oxaloacetate transaminase levels are associated with good functional outcome in acute ischemic stroke. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2011;31(6):1387-93. doi: 10.1038/jcbfm.2011.4
10. Riehle KJ, Dan YY, Campbell JS, Fausto N. New concepts in liver regeneration. *J Gastroenterol Hepatol.* 2011;26(Suppl 1):203-12. doi: 10.1111/j.1440-1746.2010.06539.x
11. Zhou W, Chen X, Zhao G, Xu D, Jiang Z, Zhang L, et al. Psoralen Induced Liver Injury by Attenuating Liver Regenerative

- Capability. *Front Pharmacol* [Internet]. 2018[cited 2019 Feb 11];9:1179. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232894/pdf/fphar-09-01179.pdf> doi: 10.3389/fphar.2018.01179
- 12.Böhm F, Köhler UA, Speicher T, Werner S. Regulation of liver regeneration by growth factors and cytokines. *EMBO Mol Med.* 2010;2(8):294-305. doi: 10.1002/emmm.201000085
13. Liu SQ, Tefft BJ, Roberts DT, Zhang LQ, Ren Y, Li YC, et al. Cardioprotective proteins upregulated in the liver in response to experimental myocardial ischemia. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* [Internet]. 2012[cited 2019 Jan 17];303(12):H1446-58. Available from: <https://www.physiology.org/doi/pdf/10.1152/ajpheart.00362.2012> doi: 10.1152/ajpheart.00362.2012
14. Liu SQ, Roberts D, Zhang B, Ren Y, Zhang LQ, Wu YH. Trefoil factor 3 as an endocrine neuroprotective factor from the liver in experimental cerebral ischemia/reperfusion injury. *PLoS One* [Internet]. 2013[cited 2019 Jan 17];8(10):e77732. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799633/pdf/pone.0077732.pdf> doi: 10.1371/journal.pone.0077732
15. Aboutaleb N, Shamsaei N, Rajabi H, Khaksari M, Erfani S, Nikbakht F, et al. Protection of Hippocampal CA1 Neurons Against Ischemia/Reperfusion Injury by Exercise Preconditioning via Modulation of Bax/Bcl-2 Ratio and Prevention of Caspase-3 Activation. *Basic Clin Neurosci.* 2016;7(1):21-9.
- 16.Dziodzio T, Biebl M, Pratschke J. Impact of brain death on ischemia/reperfusion injury in liver transplantation. *Curr Opin Organ Transplant.* 2014;19(2):108-14. doi: 10.1097/MOT.000000000001
- 17.Pirnik Z, Bundzikova J, Francisty T, Cibulova E, Lackovicova L, Mravec B, et al. Effect of liver ischemia-reperfusion injury on the activity of neurons in the rat brain. *Cell Mol Neurobiol.* 2009;29(6-7):951-60. doi: 10.1007/s10571-009-9381-7
- 18.Bundzikova J, Pirkik Z, Lackovicova L, Mravec B, Kiss A. Activation of Different Neuronal Phenotypes in the Rat Brain Induced by Liver Ischemia-Reperfusion Injury: Dual Fos/Neuropeptide Immunohistochemistry. *Cell Mol Neurobiol.* 2011;31 (2): 293-301. doi: 10.1007/s10571-010-9621-x
- 19.Ostrowski RP, Schulte RW, Nie Y, Ling T, Lee T, Manaenko A, et al. Acute splenic irradiation reduces brain injury in the rat focal ischemic stroke model. *Transl Stroke Res.* 2012;3(4):473-81. doi: 10.1007/s12975-012-0206-5
- 20.Offner H, Vandenberg AA, Hurn PD. Effect of experimental stroke on peripheral immunity: CNS ischemia induces profound immunosuppression. *Neuroscience.* 2009;158(3):1098-111. doi: 10.1016/j.neuroscience.2008.05.033
- 21.Marcet P, Santos N, Borlongan CV. When friend turns foe: central and peripheral neuroinflammation in central nervous system injury. *Neuroimmunol Neuroinflamm.* 2017; 4:82-92. doi: 10.20517/2347-8659.2017.07
- 22.Ajmo CT Jr, Collier LA, Leonardo CC, Hall AA, Green SM, Womble TA, et al. Blockade of adrenoreceptors inhibits the splenic response to stroke. *Exp Neurol.* 2009;218(1):47-55. doi: 10.1016/j.expneurol.2009.03.044
- 23.Rasouli J, Lekhraj R, Ozbalik M, Lalezari P, Casper D. Brain-spleen inflammatory coupling: a literature review. *Einstein J Biol Med.* 2011;27(2):74-7. doi: 10.23861/EJBM20112768
- 24.Offner H, Subramanian S, Parker SM, Afentoulis ME, Vandenberg AA, Hurn PD. Experimental stroke induces massive, rapid activation of the peripheral immune system. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2006;26(5):654-65. doi: 10.1038/sj.jcbfm.9600217
- 25.Seifert HA, Leonardo CC, Hall AA, Rowe DD, Collier LA, Benkovic SA, et al. The spleen contributes to stroke induced neurodegeneration through interferon gamma signaling. *Metab Brain Dis.* 2012;27(2):131-41. doi: 10.1007/s11011-012-9283-0
- 26.Chernykh YeR, Shevela YeYa, Morozov SA, Ostanin AA. Immunopatogeneticheskiye aspeki ishemicheskogo insul'ta [Immunopathogenetic aspects of ischemic stroke]. Meditsinskaya immunologiya, 2018;20(1):19-34.(in Russian)
- 27.Planas AM, Gomez-Choco M, Urra X, Gorina R, Caballero M, Chamorro A. Brain-derived antigens in lymphoid tissue of patients with acute stroke. *J Immunol.* 2012;188(5):2156-63. doi: 10.4049/jimmunol.1102289
- 28.Dotson AL, Wang J, Saugstad J, Murphy SJ, Offner H. Splenectomy reduces infarct volume and neuroinflammation in male but not female mice in experimental stroke. *J Neuroimmunol.* 2015;278:289-98. doi: 10.1016/j.jneuroim.2014.11.020
- 29.Zhang BJ, Men XJ, Lu ZQ, Li HY, Qiu W, Hu XQ. Splenectomy protects experimental rats from cerebral damage after stroke due to anti-inflammatory effects. *Chin Med J (Engl).* 2013;126(12):2354-60.
- 30.Vahidy FS, Parsha KN, Rahbar MH, Lee M, Bui TT, Nguyen C, et al. Acute splenic responses in patients with ischemic stroke and intracerebral hemorrhage. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2016; 36(6):1012-21. doi: 10.1177/0271678X15607880
- 31.Ran Y, Liu Z, Huang S, Shen J, Li F, Zhang W, et al. Splenectomy Fails to Provide Long-Term Protection Against Ischemic Stroke. *Aging Dis.* 2018;9(3):467-9. doi: 10.14336/AD.2018.0130
- 32.Seifert HA, Hall AA, Chapman CB, Collier LA, Willing AE, Pennypacker KR. A transient decrease in spleen size following stroke corresponds to splenocyte release into systemic circulation. *J Neuroimmune Pharmacol.* 2012;7(4):1017-24. doi: 10.1007/s11481-012-9406-8
- 33.Offner H, Subramanian S, Parker SM, Wang C, Afentoulis ME, Lewis A, et al. Splenic atrophy in experimental stroke is accompanied by increased regulatory T cells and circulating macrophages. *J Immunol.* 2006;176(11):6523-31.
- 34.Bao Y, Kim E, Bhosle S, Mehta H, Cho S. A role for spleen monocytes in post-ischemic brain inflammation and injury. *J Neuroinflammation* [Internet]. 2010[cited 2019 Jan 20];7:92. Available from: <https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1742-2094-7-92> doi: 10.1186/1742-2094-7-92
- 35.Grisanti LA, Perez DM, Porter JE. Modulation of immune cell function by alpha(1)-adrenergic receptor activation. *Curr Top Membr.* 2011;67:113-38. doi: 10.1016/B978-0-12-384921-2.00006-9
- 36.Chiu NL, Kaiser B, Nguyen YV, Welbourne S, Lall C, Cramer CC. The volume of the spleen and its correlates after acute stroke. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2016;25(12):2958-61. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.08.012
- 37.Famakin BM. The immune response to acute focal cerebral ischemia and associated post-stroke immunodepression: a focused review. *Aging Dis.* 2014;5(5):307-26. doi: 10.14336/AD.2014.0500307
- 38.Chauhan A, Al Mamun A, Spiegel G, Harris N, Zhu L, McCullough LD. Splenectomy protects aged mice from injury after experimental stroke. *Neurobiol Aging.* 2018;61:102-11. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2017.09.022
- 39.Fathali N, Ostrowski RP, Hasegawa Y, Lekic T, Tang J, Zhang JH. Splenic immune cells in experimental neonatal hypoxia-ischemia. *Transl Stroke Res.* 2013;4(2):208-19. doi: 10.1007/s12975-012-0239-9
- 40.Pennypacker KR, Offner H. The role of the spleen in ischemic stroke. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2015;35(2):186-7. doi: 10.1038/jcbfm.2014.212
- 41.Wang Z, He D, Zeng YY, Zhu L, Yang C, Lu YJ, et al. The spleen may be an important target of stem cell therapy for stroke. *J Neuroinflammation* [Internet]. 2019[cited 2019 Feb 27];16(1):20. Available from: <https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12974-019-1400-0> doi: 10.1186/s12974-019-1400-0
- 42.Vendrame M, Gemma C, Pennypacker KR, Bickford PC, Davis Sanberg C, Sanberg PR, et al. Cord blood rescues stroke-induced changes in splenocyte phenotype and function. *Exp Neurol.* 2006;199:191-200. doi: 10.1016/j.expneurol.2006.03.017
- 43.Liu ZJ, Chen C, Li FW, Shen JM, Yang YY, Leak RK, et al. Splenic responses in ischemic stroke: new insights into stroke pathology. *CNS Neurosci Ther.* 2015;21(4):320-6. doi: 10.1111/cn.12361
- 44.Seifert HA, Collier LA, Chapman CB, Benkovic SA, Willing AE, Pennypacker KR. Pro-inflammatory interferon gamma signaling is directly associated with stroke induced neurodegeneration. *J Neuroimmune Pharmacol.* 2014;9(5):679-89. doi: 10.1007/s11481-014-9560-2
- 45.McCulloch L, Alfieri A, McColl BW. Experimental Stroke Differentially Affects Discrete Subpopulations of Splenic Macrophages. *Front Immunol* [Internet]. 2018[cited 2019 Feb 14];9:108. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5972287/pdf/fimmu-09-01108.pdf> doi: 10.3389/fimmu.2018.01108

Наукові огляди

46.Kim E, Yang J, Beltran CD, Cho S. Role of spleen-derived monocytes/macrophages in acute ischemic brain injury. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2014;34(8):1411-9. doi: 10.1038/jcbfm.2014.101

Відомості про авторів:

Ткачук О.В. - доктор медичних наук, доцент кафедри анестезіології та реаніматології ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці.

Ткачук С.С. - доктор медичних наук, завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці.

Повар М.А. - асистент кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці.

Штефанюк В.І. - асистент кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці.

Сведения об авторах:

Ткачук А.В. - доктор медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ВГУЗ Украины "Буковинский государственный медицинский университет", г. Черновцы

Ткачук С.С. - доктор медицинских наук, заведующая кафедрой физиологии им. Я.Д. Киршенблата ВГУЗ Украины "Буковинский государственный медицинский университет", г. Черновцы.

Повар М.А. - ассистент кафедры физиологии им. Я.Д. Киршенблата ВГУЗ Украины "Буковинский государственный медицинский университет", г. Черновцы.

Штефанюк В.И. - ассистент кафедры физиологии им. Я.Д. Киршенблата ВГУЗ Украины "Буковинский государственный медицинский университет", г. Черновцы.

Information about authors:

Tkachuk A.V. - MD, assistant professor of the Department of Anesthesiology and Reanimatology of the Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi.

Tkachuk S.S. - Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Physiology named Ya.D. Kirshenblat of the Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi.

Povar M.A. - assistant of the department of physiology named after J.D. Kirshenblat of the Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi.

Shtefaniuk V.I. - assistant of the department of physiology named after J.D. Kirshenblat of the Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi.

Стаття надійшла до редакції 29.10.2019

Рецензент – проф. І.І. Заморський

© О.В. Ткачук, С.С. Ткачук, М.А. Повар, В.І. Штефанюк, 2019