

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ



МАТЕРІАЛИ

науково-практичної
конференції
з міжнародною участю



«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПАРАЗИТОЛОГІЇ У МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ»

8-9 жовтня 2020 року



Чернівці, 2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МАТЕРІАЛИ

науково-практичної
конференції
з міжнародною участю

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ
ТА ПРАКТИЧНОЇ ПАРАЗИТОЛОГІЇ
У МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ»

8-9 жовтня 2020 року

Чернівці, 2020

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИПАРАЗИТАРНОЇ ТЕРАПІЇ У ПЕДІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

*Матушак М.Р., Горошко О.М., Захарчук О.І., Ежнед М.А.,
Сахацька І.М., Костишин Л.В., Степанчук В.В., Михайлюк Н.В.*

*Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці*

За даними офіційних статистичних джерел в Україні щорічно реєструється більше 100 тис. випадків гельмінтозів, із них у 80% дітей до 17 років. Глистяна інвазія впливає на весь організм, викликаючи інтоксикацію та алергізацію організму.

Мета роботи – провести маркетинговий аналіз лікарських засобів, які використовуються при антигельмінтній терапії та визначити основні проблеми профілактики даної патології.

Проведено маркетингове дослідження та аналіз ринку торговельних найменувань, аналіз 52 медичних карт стаціонарних та амбулаторних хворих (діти віком від 12 року до 17 років) на глистяні інвазії та листків лікарських призначень лікувальних установ м. Чернівці. На першому етапі дослідження вивчили асортимент протипаразитарних лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку України. Найбільш часто використовують альбендазол (75% українського та 25% імпортного виробництва). Препарати з діючою речовиною пірантелу становлять 42,8% вітчизняного виробництва, усі інші є імпортними. За результатами опрацьованих медичних карт хворих обрали найпоширеніші схеми лікування: антигельмінтна терапія, ентеросорбенти та 5-тиденний курс блокаторів H₁-гістамінових рецепторів. Проаналізувавши усереднені вартості доби лікування, визначили, що найбільш доступними є препарати II групи.

Таким чином, із запропонованих схем фармакотерапії найбільш доступними є використання комплексу, у склад якого входить Біле вугілля, Роліноз, Зентел. Перспективним є вивчення застосування фітозасобів та дієтичних добавок як в період лікувальної терапії, так і з ціллю профілактики.