

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«АСОЦІАЦІЯ ТЕРАПЕВТІВ ІМ. В.Х.ВАСИЛЕНКА»**

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

**Матеріали науково-практичної конференції
(21-22 квітня 2011 року)**

м. Чернівці

УДК 616.1/4

ББК 54.1

А 43

Актуальні питання внутрішньої медицини: Матеріали науково-практичної конференції (Чернівці, 21-22 квітня 2011 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2011. – 212 с.

ISBN 978-966-697-391-0

У збірнику представлені матеріали тез науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини» (Чернівці, 21-22 квітня 2011 р.) із стилістикою та орфографією у авторській редакції. Публікації присвячені актуальним проблемам гастроентерології, кардіології, нефрології, пульмонології, ревматології. Наукова та загальна редакція – професор, д.мед.н. О.І.Федів

Наукові рецензенти: доктор медичних наук, професор О.І.Волошин
доктор медичних наук, професор О.С.Хухліна

ISBN 978-966-697-391-0

© Буковинський державний медичний
університет, 2011

**ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО СТАТУСУ ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ
ВИРАЗКУ ШЛУНКА ТА ДВНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ НА ТЛІ
ОСТЕОАРТРОЗУ**

*Телекі Я.М., Оліник О.Ю., Гараздюк І.В., Сердулець Ю.І., Сажина Н.І.,
Гретчин В.М.*

*Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці,
int_medicine@bsmu.edu.ua*

Вступ. Остеоартроз (ОА) є однією із серйозних медичних і соціальних проблем, що зумовлено його широкою поширеністю, високим ризиком розвитку обмежень функції опорно-рухового апарату, які призводять до порушення працездатності та зниження якості життя пацієнтів, а тим паче за умов поєднання із захворюваннями органів травлення.

Мета. Вивчити особливості клінічного статусу на основі вивчення якості життя (ЯЖ) у хворих на виразкову хворобу (ВХ) шлунка (антрального відділу) та дванадцятипалої кишки (ДПК) залежно від наявності остеоартрозу (ОА).

Матеріал і методи. Обстежено 30 хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні у ревматологічному та гастроентерологічному відділеннях обласної клінічної лікарні м. Чернівці. I-а група складалась з 15 хворих на ВХ шлунка та ДПК. До II-ї групи увійшли 15 хворих на ВХ шлунка та ДПК, поєднану з ОА. Контрольна група складалась з 15 практично здорових осіб (ПЗО). Оцінку ЯЖ проводилась за допомогою специфічного опитувальника НАQ (Health Assessment Questionnaire). Суглобовий статус оцінювали за даними больового, суглобового, запального індексів, а також локального статусу суглобів за Річі. Статистичний аналіз отриманих даних проводився з використанням програми Statistica 6,0.

Встановлено, що у хворих на ВХ шлунка та ДПК показники суглобового та локального статусу нижче ($p < 0,05$), ніж у хворих основної групи, у яких ВХ перебігала на тлі ОА, що можливе за рахунок персистуючого запального процесу в останніх за рахунок ВХ, який підтримується одним із прозапальних цитокінів, а саме інтерлейкіном-8. Індекс НАQ (опитування для оцінки стану здоров'я) у групи хворих із поєднанням патологій був на 17,8% вище ($p < 0,05$).

Висновок. У хворих на остеоартроз наявність супутньої виразкової хвороби шлунка та ДПК зумовлює погіршення клінічної картини та показників якості життя.