



Процак Т.В.

## ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ У ЛЮДЕЙ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Кафедра анатомії людини імені М.Г. Туркевича

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

Морфологічні дослідження приносових пазух на будь-якому структурному рівні спрямовані на з'ясування механізмів і патогенезу захворювань та пошуку ефективних методів лікування.

Дослідження топографо-анatomічних особливостей верхньошелепних пазух проведено на 20 препаратах верхніх щелеп, черепах і розтинах голови трупів людей юнацького віку методами препарування і комп'ютерної томографії.

Дослідження синтопії стінок верхньошелепних пазух у цій віковій групі показало, що їх формування ще не завершилося. Визначено, що на даній стадії онтогенезу верхньошелепна пазуха є найбільш вираженою порожниною з поміж інших приносових пазух, має форму неправильної чотиринктуної піраміди, основу якої утворює бічна стінка носової порожнини, а верхівку – величний відросток верхньошелепної кістки. У верхньошелепній пазусі розрізняють передню, верхню, задню, присерединю та нижню стінки. Зокрема, її передня стінка розташована між підоноямковим краєм очної ямки та комірковим відростком верхньої щелепи, вона ззовні вкрита щокою. На зовнішній поверхні кісткової стінки під підоноямковим отвором розташована іклова ямка, глибина якої дорівнює  $3,8 \pm 0,2$  мм. Товщина кісткової стінки ямки не перевищує 1,5 мм. Висота передньої стінки верхньошелепної пазухи дорівнює  $25,0 \pm 0,22$  мм. Поперечний розмір становить  $16,0 \pm 0,7$  мм.

Верхня стінка верхньошелепної пазухи утворена очноямковою поверхнею верхньої щелепи. Присередній край пазухи проекційно знаходиться на межі між внутрішнім краєм нижньої та присерединної стінок очної ямки. Топографічно її бічний край на одному препараті (5%) відповідає нижній очноямковій шілині. Зазначимо, що верхня стінка пазухи тонша у порівнянні з іншими стінками. Її товщина не перевищує 2,1-2,7 мм. Задня стінка верхньошелепної пазухи топографічно відповідає верхньошелепному горбку. У двох спостереженнях (10%) задньоверхній край пазухи прилягав до задніх комірок решітчастого лабіринту. На одному препараті (5%) задня стінка знаходилася на відстані 9,0 мм від стінки клиноподібної пазухи. Нижня стінка (дно) верхньошелепної пазухи утворена комірковим відростком верхньої щелепи. Залежно від пневматизації її дно знаходилося на різних рівнях відносно нижньої стінки носової порожнини. При середній пневматизації на трьох препаратах (15%) дно пазухи розташоване на одному рівні з нижньою стінкою носа. У шести випадках (30%) її дно знаходилося вище нижньої стінки носа, а на одному препараті (5%) – нижче дна носової порожнини. Присередня поверхня верхньошелепної пазухи одночасно утворює частину бічної стінки носової порожнини. У товщі її переднього відділу знаходиться носо-слізозовий канал, який закінчується в нижньому носовому ході під нижньою носовою раковиною. Якщо в ділянці нижнього носового ходу присередня стінка пазухи представлена кістковою тканиною та вкрита слизовою оболонкою, то в середньому носовому ході, в його середній частині, кісткова тканина частково відсутня. У краніодорсальному відділі півмісяцевого розтвору на присередній стінці виявляється вихідний отвір, що з'єднує пазуху із середнім носовим ходом. Довжина отвору становить  $6,0 \pm 1,2$  мм, висота –  $2,8 \pm 0,22$  мм. Він спрямований косо і донизу. Висота верхньошелепної пазухи дорівнює  $25,0 \pm 1,0$  мм, ширина –  $19,0 \pm 0,7$  мм і передньозадній розмір –  $25,5 \pm 0,7$  мм.

Упродовж юнацького віку продовжуються формоутворювальні процеси верхньошелепних пазух. Найбільш тонкою є верхня стінка пазухи. Виявлена варіантність синтопії верхньошелепної пазухи із суміжними утвореннями.

Товкач Ю.В.

## АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВОГО ПЕРЕХОДУ

Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

Захворювання, пов’язані з розладом замікальної функції стравохідно-шлункового переходу досить поширені в теперішній час. Аномалії травної системи становлять 17,8% і є однією з причин перинатальної смертності. Дедалі частіше трапляються випадки природженої патології стравохідно-шлункового сегмента, що потребує особливої уваги науковців до даної проблеми.

Метою дослідження стало вивчити будову і становлення топографії стравохідно-шлункового переходу у перинатальному періоді онтогенезу.

Досліджене виконано на 20 плодах (ізольовані органокомплекси черевної порожнини та трупи плодів людини) та 20 трупах новонароджених за допомогою класичних методів анатомічного дослідження.

Скелетотопічна проекція кардіального отвору шлунка змінюється в межах від рівня тіла IX грудного хребця – на 4-му місяці до рівня нижнього краю тіла XI грудного хребця – у новонароджених. Довжина черевної частини стравоходу в плодів вирізняється мінливістю. З 4-го по 6-й місяць відбувається збільшення довжини черевної частини стравоходу. У більшості плодів даного періоду ми спостерігали таку особливість: чим коротша черевна частина стравоходу, тим більший її діаметр. Починаючи з 7-го місяця, довжина черевної частини стравоходу зменшується. При зіставленні одержаних нами даних виявилося, що довжина черевної частини стравоходу в новонароджених ( $1,17 \pm 0,19$  мм) менша, ніж у плодів ( $1,17 \pm 0,21$  мм). Вважаємо, що цей