



Шульгіна В.В.

**АНКЕТУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ СКРИНІНГА ТА АНАЛІЗА ФАКТОРІВ
РИЗИКУ РОЗВИТКУ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ**

Кафедра онкології та радіології

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

Скринінг (від англ. screening просуювання) система організаційних заходів з ранньої діагностики передраку та раку. Метою медичного скринінгу є виявлення певного виду патології. При масовому скринінгу (МСК) мета досягається шляхом проведення інструментальних або лабораторних досліджень, при селективному скринінгу (ССК) – шляхом формування груп ризику. Основою ССК є анкетування. У ході проведення ССК, пацієнтам без симптомів із числа обстеженого населення, у котрих виявлена можливість розвитку хвороби, проводять подальше діагностичне обстеження, для її підтвердження або спростування. При ССК виконується збір об'ємної інформації щодо обстежених, переважно відомостей генеалогічної історії, які розглядаються як фактори ризику (ФР) патології що піддається скринінгу. Обробка і оцінка результатів СК проводиться з метою ідентифікації патології.

Лікування хворих на РГЗ у III-й стадії коштує в 15-30 разів дорожче, ніж при I стадії. В той же час на діагностику витрачається тільки 5% коштів, а 95% - на лікування. Це співвідношення необхідно змінити у бік збільшення витрат на діагностику. У групах жінок, які регулярно проходять мамографію, РГЗ у I стадії виявляється у 50-70% випадках, у 1/3 хворих має доклінічну стадію (при пальпації РГЗ не визначається). У групі пацієнтів, які щорічно проходять профілактичний огляд, з проведенням мамографічного дослідження, виживання хворих з I стадією захворювання становить майже 100%.

Для проведення скринінгових обстежень у жінок з приводу оцінки стану молочних залоз та для аналізу факторів ризику передраку та раку грудної залози була розроблена анкета. В неї вводяться дані пацієнтки, національність, місце народження, спосіб життя, вид трудової діяльності, професійна та побутова шкідливість, шкідливі звички, дані про родичів які хворіли на РГЗ, вікові категорії, що віддзеркалюють характер гормональної активності та фертильності.

В анкеті використовуються рекомендації щодо проведення скринінгових обстежень у жінок з приводу оцінки патологічних утворень грудної залози за прийнятою у світі єдиною системою реєстрації результатів мамографії. Після завершення мамографічного обстеження результати класифікують відповідно до однієї з категорій BI-RADS (1-6, 0). Категорія 0 - вимагає проведення додаткових візуалізаційних досліджень і/або раніше отримані мамограми для порівняння. Ця категорія вказує на неповну, незавершену оцінку, визначається як результат, що потребує додаткової оцінки, її майже завжди використовують у контексті скринінгових обстежень. Рекомендація щодо додаткового візуалізаційного дослідження може включати прищільне мамографічне обстеження з компресією, зі збільшенням зображення, спеціальними ракурсами мамографічних знімків і проведення ультразвукових досліджень, але не обмежується цим.

Отже, враховуючи дані літератури та наших досліджень, для планування організаційних заходів у охороні здоров'я, доцільно використовувати можливості інформаційних відомостей анкетування для оцінки стану здоров'я жіночого населення в регіоні його проведення та виявлення особливостей структури сукупності чинників ризику в патології раку грудної залози. Ефективність лікування раку, виявленого в доклінічній стадії більша, матеріальні витрати на лікування значно менші, тому що можна обмежитись тільки хірургічним втручанням. У разі впровадження скринінгової програми України очікуваний позитивний результат при стовідсотковому охопленні жіночого населення буде складати близько 87%, з аналогією Національного Інституту Раку США.

СЕКЦІЯ 15

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ШКІРНО-ВЕНЕРИЧНИХ, ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Bogachyk N. A., Sydorchuk A. S., Venglovska Y. V., Sorokhan V.D.

**RETROSPECTIVE ANALYSIS OF NON-TYPHOIDAL SALMONELLA INFECTIONS AT BUKOVYNA
FOR THE PERIOD SINCE 2011 UNTIL 2016**

Department of internal medicine and infectious diseases

Higher state educational establishment of Ukraine

«Bukovyna State Medical University»

The research purpose is to study the clinical, epidemiological and microbiological features of NTS at Bukovyna region over the last five years (2011-2016) based upon retrospective analysis method, and to determine the regional characteristics of infectious diseases specified nowadays.

It has been analyzed totally 377 cases of gastrointestinal salmonellosis based on a retrospective analysis of the «Patient' medical history and stationary card» of all hospitalized to the Department of infectious diseases during the period from 2011 to 2016. In the majority of enrolled cases there were diagnosed a gastroenteric clinical form (in 73% of cases) and gastroenterocolitic form (in 27% of cases), and 2 patients - with the verified acute carrier (with the release of the antibiotic-resistant strain of Salmonella enteritidis up to 3 months after admission time). For bacteriological study stool samples were taken and seed into appropriate culture media by classical method. It had been treated 377 patients at the Department of intestinal infectious diseases of Municipal Chernivtsi Clinical Hospital during the period of 2011-