

# Клінічні дослідження

УДК 616.24.-003.823-053.31-092-085.835.3-07

**Л.О. Безруков, Ю.Б. Ященко**

## ЗМІНИ В ЛЕГЕНЕВОМУ ЕКСПРАТІ ТА ПЛАЗМІ КРОВІ БІОХІМІЧНИХ ТА ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ ПРИРОДЖЕНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ ТА ПОСТАСФІКТИЧНИМ СИНДРОМОМ

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. – проф. Л.О. Безруков)  
Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

**Резюме.** Для новонароджених із природженою пневмонією та постасфіктичним синдромом характерно підвищення спонтанної активності нейтрофільних гранулоцитів крові. Крім того, у новонароджених із пневмонією відмічається підвищена фагоцитарна активність нейтрофілів крові. Дослідження легеневих експіратів встановило зв'язок змін легеневих біохімічних показ-

ників із нейтрофільною активією. Виявлено варіабельність показників протеолітично-фібринолітичної активності легеневих експіратів у новонароджених при природжений пневмонії та постасфіктичному синдромі.

**Ключові слова:** новонароджені, пневмонія, постасфіктичний синдром, легеневий експірат.

**Вступ.** Важливою проблемою неонатальної пульмонології останніх років є природжені пневмонії, тому що частота даної патології зростає з кожним роком, а летальність залишається високою, незважаючи на значні успіхи в лікуванні тяжкохворих новонароджених [2]. Незважаючи на значний розвиток технологій лікування дихальної недостатності в новонароджених впродовж останніх десятиріч, проблема дихальних розладів у даній віковій групі дітей залишається актуальною [1]. Це пов’язано як із труднощами в діагностиці причин неонатального респіраторного дистресу, відсутністю специфічних характерних клінічних симптомів основних нозологічних форм, які призводять до респіраторних розладів, так і з розвитком дихальної недостатності в новонароджених на тлі іншої, позалегеневої патології, що утруднює не тільки своєчасну діагностику, але й призводить до запізнілого початку етіотропного лікування.

**Мета дослідження.** Обґрунтувати зміни біохімічних та імунологічних показників плазми крові та конденсату видихуваного повітря в новонароджених з тяжкою дихальною недостатністю при природжений пневмонії та постасфіктичному синдромі.

**Матеріал і методи.** Дослідження проведено серед 50 новонароджених, які знаходилися на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії новонароджених ОДЛ №1 м. Чернівці. Всі діти перебували у складі тяжкому стані, що клінічно проявляється тяжким ступенем респіраторного напруження та потребувало апаратної підтримки дихання в режимі примусової вентиляції. Тяжка асфіксія в пологах, як основний діагноз, була серед 20 немовлят (І група спостереження). До ІІ групи спостереження увійшли 20 дітей із природженою пневмонією. Контрольну групу склали 10 практично здорових новонароджених, які перебували на реабілітаційному лікуванні в лікарні після гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи.

Біохімічні та імунологічні показники досліджували в плазмі крові дітей та в конденсаті видихуваного повітря (КВП). Легеневі експірати збиралі з системи дихального контуру апарату штучної вентиляції легень (на видиху). У контрольній групі дітей КВП збиралі за методом Сидоренка Г.І. та співавт. (1980), використовуючи модифікований прилад.

Імунологічне дослідження крові включало вивчення нейтрофільних показників - фагоцитарного числа та фагоцитарної активності за методикою Чернущенко Е.Ф. та Когосової Л.С., активності нейтрофільних гранулоцитів крові за показниками їх киснезалежного метаболізму за даними НСТ-тесту, спонтанного та стимульованого (Park B. et al., 1968 у модифікації Климова В.В. та співавт., 1988).

Біохімічне дослідження (Деклараційний патент на винахід №6853 Україна, МКВ 7A61B5/00. Способ діагностики синдрому гострого пошкодження легень у новонароджених) включало оцінку в КВП необмеженого протеолізу за лізисом азоальбуміну (лізис низькодисперсних білків), азоказеїну (лізис високомолекулярних білків) та азоколу (лізис колагену) за допомогою реактивів фірми "Simko Ltd.", Україна. Використовуючи реактиви цієї ж фірми, досліджували фібринолітичну активність (Кухарчук О.Л., 1996).

Статистичну обробку результатів дослідження проводили методом варіаційної статистики та кореляційного аналізу за програмою StatSoft Statistica v6.0 на PC.

**Результати дослідження та їх обговорення.** Провідну роль у розвитку запалення легенів відіграють моноцити та нейтрофіли. При взаємодії з бактеріями вони активуються, а в гранулах цитоплазми накопичують потужні протеази [4], збільшують поглинання кисню та генерацію активних форм кисню (кисневий вибух), а також оксиду азоту. У таблиці 1 наведені зміни нейтрофільної активації у новонароджених груп порівняння.

Таблиця 1

**Показники активності нейтрофільних гранулоцитів крові у новонароджених при природженій пневмонії та при постасфіктичному синдромі**

Показники	Група контролю (n=10)	Група I (n=20)	Група II (n=20)	P
Фагоцитарна активність, %	70,9±1,4	62,8±3,4	85,2±6,8	P>0,05 * **
Фагоцитарне число, у.о.	3,7±0,2	3,25±0,2	13,97±2,3	P<0,05 **
НСТ-тест спонтанний, %	16,29±0,7	25,1±2,1	44,01±8,4	P<0,05 * **
НСТ-тест стимульований, %	40,3±1,9	40,1±2,3	49,6±7,3	P>0,05 * **

Примітка. \* - відмінність між I групою та групою контролю; \*\* - відмінність між II групою та групою контролю

Таблиця 2

**Показники протеолітично-фібринолітичної активності легеневих експіратів**

Показники	Група контролю (n=10)	Група I (n=20)	Група II (n=20)	P
Лізис азоальбуміну, Е <sub>440</sub> /мл/год	1,15±0,06	1,35±0,15	1,71±0,14	P<0,05 **
Лізис азоказеїну, Е <sub>440</sub> /мл/год	1,50±0,06	1,56±0,22	1,99±0,19	P>0,05
Лізис азоколу, Е <sub>440</sub> /мл/год	0,23±0,01	0,20±0,03	0,41±0,08	P>0,05
Сумарна фібринолітична активність, Е <sub>440</sub> /мл/год	0,91±0,05	0,53±0,06	0,81±0,07	P<0,05 *
Неферментативна фібринолітична активність, Е <sub>440</sub> /мл/год	0,23±0,02	0,24±0,03	0,36±0,03	P<0,05 **
Ферментативна фібринолітична активність, Е <sub>440</sub> /мл/год	0,68±0,04	0,29±0,03	0,44±0,04	P<0,05 * **

Примітка. \* - відмінність між I групою та групою контролю; \*\* - відмінність між II групою та групою контролю

Дослідження функціонального стану (метаболічної активності) нейтрофільних гранулоцитів крові показало, що в новонароджених як на фоні природженої пневмонії, так і на фоні постасфіктичного синдрому, спостерігається напруженість клітинного імунітету за показниками спонтанного НСТ-тесту. Підвищена функціональна активність нейтрофілів крові у дітей груп спостереження може бути як неспецифічною, особливо це стосується новонароджених із постасфіктичним синдромом, коли на тлі розвитку критичного стану відбувається неспецифічна активація киснезалежного метаболізму нейтрофілів та підвищується їх здатність до утворення біооксидантів (так званий «респіраторний вибух»), так і специфічно – у новонароджених із природженою пневмонією на фоні інфекційного стимулу. Крім того, серед II групи дітей мала місце тенденція до зростання фагоцитарної активності нейтрофілів крові за даними фагоцитарного числа, що може свідчити про активацію ферментативної функції нейтрофілів *in vivo* під впливом бактеріального запального процесу.

Пошкоджувальними чинниками активованих нейтрофілів виступають вивільнені клітинні ферменти, продукти метаболічного «вибуху»: активні форми кисню та оксиду азоту, наслідком чого є порушення легеневої мікроциркуляції, що призводить до активації фібринолітичної системи та ендотоксикозу продуктами протеолізу з пошкодженням мембраних клітин (зокрема ендотелійних гранулоцитів легеневих капілярів), підвищення судинної проникливості та блокади легеневої мікроциркуляції [4].

Дослідження легеневої протеолітично-фібринолітичної активності в групах новонароджених за результатами активності протеолізу та фібринолізу КВП (табл. 2) показало вірогідне збільшення активності показників протеолізу в новонароджених із природженою пневмонією за рахунок лізису низькодисперсних білків, що складає передумови для ушкодження базальних мембрани аерогематичного бар'єра. Про нейтрофільну зумовленість даного патофізіологічного процесу свідчить встановлений вірогідний позитивний зв'язок між фагоцитарною активністю нейтрофілів крові та внутрішньолегеневим лізисом низькодисперсних білків ( $r=0,72$ ;  $p=0,025$ ).

Аналіз активності легеневого фібринолізу показав розвиток дисбалансу в показниках ферментативної (плазмінзалежної) та неферментативної (клітинної) фібринолітичної активності легеневих експіратів у новонароджених груп спостереження – зменшення сумарної фібринолітичної активності за рахунок пригнічення ферментативного фібринолізу. Роль плазмін-залежного фібринолізу набуває великого значення при гострих пневмоніях, коли фібрин, що надходить з ексудату, заповнюючи альвеоли та дрібні бронхи, повинен бути своєчасно розчепленим та елімінованим. Згідно із сучасним дослідженням, у періоді розпалу пневмонії відмічається пригнічення фібринолізу. Пригнічення плазмінзалежного фібринолізу в новонароджених із тяжкою дихальною недостатністю на тлі постасфіктичного синдрому може свідчити про неспецифічне ураження легенів при даному синдромі і розвиток гострого респіраторного дистрес-синдрому в новонароджених

даної групи спостереження, що ймовірно і стало причиною розвитку серед них тяжкого респіраторного дистресу. Підвищення неферментативної фібринолітичної активності легеневих експіратів у новонароджених із природженою пневмонією свідчить про залучення клітинного фібринолізу до процесів відновлення аерогематичного бар'єра в умовах легеневого запалення.

### Висновок

У новонароджених з тяжкою дихальною недостатністю на тлі природженої пневмонії та постасфіктичного синдрому відбувається активація нейтрофільних гранулоцитів крові за рахунок специфічного (інфекційного) стимулу при природжений пневмонії та неспецифічного компонентів, що становить ризик розвитку в даній групі дітей синдрому гострого пошкодження легенів (початкової стадії гострого респіраторного дистрес-синдрому).

**Перспективи подальших досліджень.** Дослідження діагностичних критеріїв змін протеолітичної та фібринолітичної активності легеневих експіратів у новонароджених із тяжкою дихально-

ною недостатністю на тлі різної патології є перспективним напрямом для ранньої діагностики причин розвитку респіраторного дистресу та обґрунтування індивідуалізованої патогенетичної терапії.

### Література

- Суліма О.Г., Добрянський Д.О., П'ясецька Н.М. Діагностика, профілактика та лікування гострих легеневих захворювань у новонароджених дітей (Навчально-методичний посібник для лікарів). – Львів: ТзОВ „Простір-М”, 1999. – 86 с.
- Сулима Е.Г., Гойда Н.Г. Неонатальная пульмонология на современном этапе: достижения, проблемы и пути их решения // Современная педиатрия. – 2004, №3(4). - С. 34-36.
- Ferrera P.J., Bunch T. et al. Circulating neutrophil concentration and respiratory distress in premature infants // J. Pediatrics. – 2000. – V. 136, N 4. – P. 466-472.
- Piantadosi C.A., Schwartz D.A. The Acute Respiratory Distress Syndrome // Annals of Internal Medicine. – 2004. – Vol. 141, N. 6. – P. 460-470.

## ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГОЧНОМ ЭКСПИРАТЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ БИОХИМИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ И ПОСТАСФИКТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Л.О.Безруков, Ю.Б.Ященко

**Резюме.** Для новорожденных с врожденной пневмонией и постасфикационным синдромом характерно повышение спонтанной активности нейтрофильных гранулоцитов крови. Кроме того, у новорожденных с пневмонией отмечается повышенная фагоцитарная активность нейтрофилов крови. Исследование легочных экспираторов показало взаимосвязь изменений легочных биохимических показателей с нейтрофильной активацией. Выявлена вариабельность показателей активности протеолиза и фибринолиза легочных экспираторов у новорожденных с врожденной пневмонией и постасфикационным синдромом.

**Ключевые слова:** новорожденные, пневмония, постасфикационный синдром, легочный экспират.

## CHANGES IN PULMONARY EXPIRATE AND BLOOD PLASMA OF BIOCHEMICAL AND IMMUNOLOGICAL INDICES IN NEWBORNS WITH CONGENITAL PNEUMONIA WITH POSTASPHYSIAL SYNDROME

L.O.Bezrukov, Yu.B.Yashchenko

**Abstract.** An increase of spontaneous activity of blood neutrophilic granulocytes is characteristic of newborns with congenital pneumonia and postasphytic syndrome. Moreover, an elevated phagocytic activity of blood neutrophils is marked in neonates with pneumonia. A study of pulmonary expirates has demonstrated a link of changes of pulmonary biochemical parameters with neutrophilic activation. A variability of the indices of the proteolytic-fibrinolytic activity of pulmonary expirates in newborns with congenital pneumonia and postasphytic syndrome has been disclosed.

**Key words:** newborns, pneumonia, postasphytic syndrome, pulmonary expirate.

Буковинський державний університет

Buk. Med. Herald. – 2007. – Vol.11, №4. - P.3-5

Надійшла до редакції 10.07.2007 року