

Міністерство охорони здоров'я України
Академія медичних наук України
Асоціація педіатрів України
Асоціація акушерів-гінекологів України
Федерація педіатрів країн СНД



**ПЕДІАТРІЯ,
АКУШЕРСТВО
ТА ГІНЕКОЛОГІЯ**
№4 (446) 2011
ЛІПЕНЬ-СЕРПЕНЬ
Заснований 1936 року
Київ

Головний редактор **Майданник В.Г.**
Заступник головного редактора **Антипкін Ю.Г.**
Заступник головного редактора **Лук'янова О.М.**
Заступник головного редактора **Венцківський Б.М.**
Відповідальний секретар **Фатюшина Н.А.**

«Педіатрія, акушерство та гінекологія»
цитується й індексується
в «**Index Medicus**» та «**Current Contents**»

«Pediatriya, Akusherstvo ta Ginekologiya»
is a peer reviewed journal referenced
in «**Index Medicus**» and «**Current Contents**»

Журнал «**Педіатрія, акушерство
та гінекологія**» представлений
в інформаційно-довідковому виданні
Ulrich's International Periodical Directory

Рекомендовано до видання
Вченю радою Інституту педіатрії,
акушерства та гінекології АМН України

Адреса редакції: 01004, Київ-4,
вул. Л. Толстого, 10, к. 15, тел. 234-23-45
E-mail: mvitaly@i.com.ua
Web-site: <http://www.pag-journal.kiev.ua>

Журнал «Педіатрія, акушерство
та гінекологія» входить до Переліку
проводних наукових журналів та видань ВАК,
в яких повинні бути опубліковані основні
результати на здобуття наукового ступеня
кандидата та доктора медичних наук

До друку приймаються наукові матеріали,
які відповідають вимогам до публікацій
у журналі «Педіатрія, акушерство
та гінекологія» після їх рецензування
фахівцями

Передруковувати матеріали дозволяється
лише за письмовим дозволом редакції
та з обов'язковим посиланням на журнал

Редакція та видавець
не несуть відповідальності
за достовірність інформації,
опублікованої в рекламних матеріалах



ПЕДІАТРІЯ

Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров'я України

Асоціація педіатрів України

ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України”
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ

Матеріали VII конгресу педіатрів України
(11–13 жовтня 2011 р., Київ)

За редакцією

О.М. Лук'янової, Ю.Г. Антипкіна, В.Г. Майданника

Редакційна колегія

О.М. Лук'янова, Ю.Г. Антипкін, В.Г. Майданник, Н.А. Фатюшина, Ю.К. Больбот,
О.П. Волосовець, О.З. Гнатейко, К.Д. Дука, М.М. Коренєв, В.П. Неділько,
Л.І. Омельченко, С.С. Острополець, В.С. Приходько, І.С. Сміян, С.К. Ткаченко

Київ – 2011

ний процес, що містить різні форми етапного рубіжного контролю. Позитивна динаміка показників контролю знань з педіатрії та впровадження зasad кредитно-модульної системи навчання у формі «Модуль. Невідкладні стани» дозволили досягти покращання рейтингової оцінки університету за результатами ЛП «Крок-3». Отже, психоемоційні та психосоматичні особливості стану лікарів-інтернів, ймовірно, погіршують результативність тестування інтернів. З показниками стійкості до стресу, емоційної лабільності, чутливості нервової системи до зовнішніх чинників, ситуативної нервозності, мотиваційним фактором, станом розумової працездатності результати складання ЛП «Крок-3» достовірно не асоціювали, що свідчить про готовність та достатню адаптацію майбутніх лікарів-педіатрів до стресогенних ситуацій, пов'язаних з оцінкою їх професійного рівня незалежно від особливостей особистісних рис.

ЕФЕКТИВНІСТЬ БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ АЦЕТИЛЮВАННЯ

О.К. КОЛОСКОВА, Л.В. МИКАЛЮК, Т.М. ВОРОТНЯК

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Мета роботи: оцінити ефективність лікування дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від типу ацетилювання.

На базі Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці обстежено 105 дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму (БА). Клінічні групи сформували за типом ацетилювання: пацієнтів із вмістом ацетильованого сульфадімезину більше 75% відносили до швидких «ацетилаторів» (I група), а менше 75% – до повільних (II група). Середній вік дітей I групи становив $12,5 \pm 0,5$ року ($71,8 \pm 6,63\%$ хлопчиків, 60% сільських мешканців), II групи – $13,0 \pm 0,4$ року ($64,9 \pm 6,38\%$ хлопчиків, 54,4% сільських мешканців). Отже, групи порівняння були порівнюваними за основними клінічними характеристиками. Контролючу терапію впродовж 10–12 місяців призначали відповідно до рекомендацій GINA-2008. Відсутність достовірних розбіжностей за частотою застосування варіантів базисної терапії (інгаляційні глюокортикостероїди, β_2 -агоністи, метилксантини, інгібтори лейкотріенових receptorів) у групах порівняння дозволила в подальшому об'єктивно оцінити ефективність контролюючої терапії, що здійснювали у вигляді консталіації балів. При цьому зменшення суми балів свідчило про ефективність контролюючої терапії, а збільшення – про його погіршення. Ефективність лікування оцінювали за зниженням абсолютноого (ЗАР) та відносного ризиків (ЗВР).

Відмічено, що наприкінці актуального спостереження пацієнти зі швидким типом ацетилювання порівняно з повільним ацетилаторним фенотипом достовірно краще відповідали на призначну терапію. Так, у них зменшувалася частота денніх симптомів з 2,7 до 1,7 бала (ЗАР 22,5%, ЗВР 32,3%), нічних симптомів БА – з 1,3 до 0,7 бала (ЗАР 8,2%, ЗВР 18,9%), обмеження фізичної активності – з 2,0 до 1,1 бала (ЗАР 28,4%, ЗВР 40,8%), а також частота позапланових візитів до алерголога – з 1,6 до 0,7 бала (ЗАР 16,7%, ЗВР 24,0%).

Водночас, у дітей із повільним ацетилаторним фенотипом наприкінці курсової контролюючої терапії достовірно зменшувалася лише частота загострень упродовж календарного року (з 3,4 до 2,6 бала, ЗАР 6,4%, ЗВР 18,4%). Це дає підстави вважати, що проведене контролююче лікування у цих дітей порівняно з пацієнтами зі швидким типом ацетилювання виявилося менш ефективним і недостатнім для досягнення контролю над захворюванням. Отже, за наявності в дитини повільного типу ацетилювання, слід призначати більший обсяг базисної терапії, або підніматися на одну «сходинку» вище відповідно до рекомендацій GINA-2008.

Таким чином, після курсу базисної терапії у хворих на БА дітей із швидким типом ацетилювання відмічено зниження ризику більшості показників контролю над бронхіальною астмою, а в хворих із повільним ацетилаторним фенотипом достовірно зменшувалася лише частота загострень на рік. Діти з повільним типом ацетилювання потребують призначення більшого обсягу базисного протизапального лікування для досягнення повного контролю над захворюванням.

ПРОГНОЗУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ

О.В. КОНОНЕНКО, І.І. ТЕРЕЩЕНКОВА, І.Р. СІНЯЄВА

Харківський національний медичний університет

Рання діагностика хронічного захворювання нирок (ХЗН) у дітей нерідко викликає труднощі через безсимптомність перебігу багатьох нефрологічних захворювань. Нами розроблено алгоритм прогнозування формування ХЗН у дітей при першому епізоді гострого ниркового захворювання, а саме гострому гломерулонефриті (ГГН), який найчастіше призводить до формування хронічної ниркової патології. Враховуючи той факт, що асиметричний диметиларгінін (АДМА), можливо, є раннім предиктором ХЗН та хронічної ниркової недостатності, визначення АДМА, метаболітів оксиду азоту використано як маркер прогресування захворювання нирок.