

ОХОР  
РЖАВН  
І.Г.С  
ІМ


МІжнародний медичний  
конгрес студентів  
та молодих вчених

ІІІ МІжнародний конгрес

27-29

квітня  
2009 року  
Тернопіль  
Україна

Тернопіль  
2009



## **Матеріали XIII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених**

*Гресько Людмила, Федів Олександр, Малюх Лариса, Гавриш Лариса*

### **ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУКОГЕНУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ІЗ СУПУТНІМИ ГАСТРОДУОДЕНОПАТИЯМИ, ІНДУКОВАНИМИ НЕСТЕРОЇДНИМИ**

#### **ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ**

Кафедра внутрішньої медицини та ендокринології

Науковий керівник – д-р мед. наук, проф. О.І. Федів

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

Остеоартроз (OA) є одним із найбільш розповсюджених захворювань суглобів. Провідне місце у лікуванні OA займають нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). Однак використання НПЗП підвищує ризик розвитку ерозивно-виразкових явищ шлунково-кишкового тракту в 3-5 раз, а кровотеч перфорацій – у 8 раз.

Метою роботи було визначення ефективності застосування цитопротектора мукогену (ребаміліду) при гастродуоденопатіях, асоційованих із застосуванням НПЗП, у хворих на OA.

Обстежено 26 хворих на OA із супутньою гастродуоденопатією, індукованою НПЗП (22 жінки і 4 чоловіки, середній вік –  $(59,7 \pm 11,6)$  років), яким на тлі базисної терапії призначали цитопротектор – ребамілід («Мукоген», Macleods Pharmaceuticals Limited). Всім хворим було проведено збір скарг та анамнезу, біохімічні дослідження крові та фіброгастродуоденоскопію з прицільною біопсією.

У 5 хворих (19,23 %) на OA діагностували пептичну виразку шлунка, у 9 (34,62 %) був виявлений ерозивний гастрит, у 46,15 % - помірний гастродуоденіт (12 хворих). Після проведеного лікування із включенням до лікувального комплексу ребаміліду спостерігали загоєння виразки у 100 % хворих на 5-6-й тиждень лікування та істотно зменшувались ознаки запалення слизової оболонки у інших обстежуваних.

Проведені дослідження свідчать про ефективність застосування цитопротектора мукогену в лікуванні хворих на OA із супутньою гастродуоденопатією, індукованою НПЗП.

*Грушецька А*

### **ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ВІДНОВНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ, ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ ГОСТРИХ КОРОНАРНИХ СТАНІВ**

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна

Сьогодні досягнуто визначних успіхів у лікуванні хворих, що перенесли гострі коронарні стани (ГКС), проте прогноз у таких хворих залишається несприятливий. Традиційні підходи до лікування ішемічної хвороби серця (ІХС) спрямовані на поліпшення транспорту кисню до клітини (принцип всіх коронаролітиків) і зниження потреби клітин у кисні (принцип блокаторів бета-адренорецепторів, що знижують скоротливість і рівень артеріального тиску, уповільнюють серцевий ритм). Таке лікування дозволяє контролювати частоту серцевих скорочень, покращувати коронарний кровоплив, оптимізувати гемодинаміку тощо. Одним з перспективних підходів до оптимізації лікування таких хворих є застосування засобів, які здатні вплинути на енергетичні процеси в міокарді через оптимальне забезпечення потреби міокарда в кисні, володіючи в першу чергу вираженими цитопротекторними властивостями. Такими властивостями володіє препарат – метамакс, який привернув нашу увагу. Основними фармакологічно активними речовинами якого є триметилпропіонат ділідрат.

Мета дослідження – проаналізувати аналіз показників толерантності до фізичних навантажень в процесі відновного лікування хворих, що перенесли гострі коронарні стани з використанням кардіопротектора метамакс. Для вирішення поставленого завдання ми обстежили 30 хворих, в залежності від клініко-електрокардіографічних форм гострих коронарних синдромів яких поділили на групи: 1. Хворі із нестабільною стенокардією; 2. Хворі із не Q-інфаркт міокарда; 3. Хворі із Q-інфаркт міокарда.

Діагноз ГКС встановлювали на підставі клінічних, електрокардіографічних та біохімічних критеріїв відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів (2003). Показники толерантності до фізичних навантажень визначали за допомогою тесту із 6 хв. ходьбою. Динаміку добової кількості епізодів депресії сегмента ST проводили згідно монітурування ЕКГ. Стандартна терапія згідно рекомендацій Українського кардіологічного товариства включала нітрати (нітросорбід), антитурмобоцитарні середники (аспірин),  $\beta$ -адреноблокатори (атенолол), інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (еналаприл), ліпідознижуючі засоби (симвастин). окрема група хворих до стандартного лікування отримала метамаксу в дозі 500 мл внутрішньовенного краплинного у кількості 10 ін'єкцій.

Аналіз показників 6 хв. тесту показали, у групах хворих, які отримували метамакс на кінець 3-го тижня достовірно частіше спостерігалася зниження числа епізодів ішемії міокарда. Таким чином, одержані нами результати свідчать про ефективність метамаксу в комплексному лікуванні ХСН.

Матеріали XIII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених

Ганьбергер Ірина

ЕНДОГЕННА ІНТОКСИКАЦІЯ ПРИ ПЕРВИННОМУ ОСТЕОАРТРОЗУ ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМИ ВІРУСНИМИ ГЕПАТИТАМИ ТА ХОЗЛ.....

Гарач Тетяна, Грод Марія

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІGU ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИTU, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ.....

Гирін Віталій

ДІСРЕГУЛЯЦІЯ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ У ХВОРИХ НА ЦД 1-ГО ТИПУ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИТРУ АНТИТІЛ ДО ВІРУСІВ КОКСАКІ В.....

Гриценко Софія

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ЛІПІДЗНИЖЮЧОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ПІСЛЯІНФАРКТНИЙ КАРДІОСКЛЕРОЗ, АСОЦІОВАНІЙ З ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ.....

Гурський Віталій

ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У КРОВІ В ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ НІРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ.....

Гулало Анна

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ЯК НЕЗАЛЕЖНИЙ ФАКТОР РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ У МАЛОСИМПТОМНИХ ХВОРИХ.....

Гусак Софія

КЛІНІЧНА ОЦІНКА ПЕРЕБІGU ПЕРВИННОГО ОСТЕОАРТРОЗУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ.....

Гресько Людмила, Федів Олександр, Малюх Лариса, Гавриш Лариса

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУКОГЕНУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ІЗ СУПУТНІМИ ГАСТРОДУОДЕНОПАТИЯМИ, ІНДУКОВАНИМИ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ.....

Грушецька А

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ВІДНОВНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ, ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ ГОСТРИХ КОРОНАРНИХ СТАНІВ.....

Дегтярева Оксана

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА ПОВТОРНЫХ КОРОНАРНЫХ СОБЫТИЙ И ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ.....

Затолокина Е., Квіткова Л.

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗОБОВ СРЕДИ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА – ЖИТЕЛЬНИЦ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЙОДОДЕФІЦИТНОГО РЕГІОНА.....

Калашник Дарья, Смолкин Илья

УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛІПІДНОГО СПЕКТРА У ЖЕНЩИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.....

Каменір Вікторія, Беседіна Ала

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМІ ЛІКУВАННЯ ГАСТРОЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ (ГЕРХ) НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ (ХОЗЛ). . . . .

Квасніцька Оксана

ПОРУШЕННЯ МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕНКІЇ.....

Кирнац О

ПСИХОПАТОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ОСОБЛИВОСТІ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОГО ЛІКУВАННЯ.....