


616.33  
Б 90

Буздуган І.О., Федів О.І., Букач О.П.

**КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЛІКУВАННЯ  
ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ  
КИШКИ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА  
ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ**

*Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування*

Монографія



Чернівці – 2021

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Буздуган І.О., Федів О.І., Букач О.П.

**КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЛІКУВАННЯ  
ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ  
КИШКИ У ПОСДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА  
ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ**

*Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування*  
**Монографія**

Чернівці – 2021

УДК : 616.33/342-002.44-06:616.1/4]-036-07-08-092

ББК. Б 90

**I.O. Буздуган, О.І. Федів, О.П. Букач Клініко-патогенетичні особливості та лікування пептичної виразки шлунка і дванадцятипалої кишki у поєднанні з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу. – Чернівці: БДМУ, 2021. – 107с.**

**Рецензенти:**

доктор медичних наук, професор **Ганич Тарас Михайлович**, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», професор кафедри факультетської терапії

доктор медичних наук, професор **Скляров Євген Якович**, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, професор кафедри терапії №1 та медичної діагностики ФПДО

доктор медичних наук, професор **Волошин Олександр Іванович**, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Рекомендовано до видання Вченю Радою Буковинського державного медичного університету від 25 лютого 2021 року (протокол №6)

У монографії наведене узагальнення даних літератури та результати власних досліджень поширеності, етіології патогенетичної ролі інфекції Нр, метаболічних, гемокоагуляційних та генетичних механізмів розвитку та прогресування пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишki у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2.

Монографія розрахована на терапевтів, гастроenterологів, ендокринологів, кардіологів, сімейних лікарів, наукових співробітників, лікарів-інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти України.

ISBN 978-966-697-920-2

© I.O.Буздуган, О.І. Федів, О.П. Букач

Бібліотека  
БДМУ

480405

## ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ .....	5
ПЕРЕДМОВА.....	7
РОЗДІЛ 1. ПОШИРЕНІСТЬ ІНФЕКЦІЇ H.PYLORI ТА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2.....	9
РОЗДІЛ 2 ГІСТОЛОГІЧНІ ТА ГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПРИ ПЕПТИЧНІЙ ВИРАЗЦІ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2.....	26
РОЗДІЛ 3 ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ ГЕНІВ CAG A I VAC A HELICOBACTER PYLORI.....	40
3.1. Показники вмісту деяких цитокінів у сироватці крові у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 залежно від наявності генів cagA і vacA Helicobacter pylori .....	40
3.2. Показники оксидантно-протиксидантного гомеостазу та протеолітичної активності плазми крові у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 залежно від наявності генів cagA і vacA Helicobacter pylori.....	45
3.3. Показники функціонального стану ендотелію, гемокоагуляції, фібринолізу та морфо-функціональних властивостей еритроцитів у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 залежно від наявності генів cagA і vacA Helicobacter pylori.....	49
3.4. Особливості ліпідного профілю сироватки крові у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 залежно від наявності генів cagA і vacA Helicobacter	

<i>pylori</i> .....	59
РОЗДІЛ 4. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАНЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ПРОБІОТИКА ПРИ ПЕПТИЧНІЙ ВИРАЗЦІ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, АСОЦІЙОВАНІЙ З ТОКСИГЕННИМИ ШТАМАМИ <i>HELICOBACTER PYLORI</i> , У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 .....	61
ПІДСУМОК.....	83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	93