

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Державне некомерційне підприємство «Центр тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
«Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров'я України»
(ДНП «Центр тестування»)

ПОГОДЖЕНО

Віце президент
Національної академії медичних наук
України


Володимир КОВАЛЕНКО
«08» березня 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Міністра охорони
здоров'я України


Ірина МИКИЧАК
«08» березня 2023 р.

П Е Р Е Л І К

наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження
досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я

(Випуск 9)

Київ – 2023

10. Вагітні із гіпоплазією хоріону внаслідок загрози переривання вагітності в ранні терміни гестації.
 11. Індивідуальна непереносимість компонентів, що входять до складу препаратів.
 12. Побічних ефектів не спостерігалось.
 13. Буковинський державний медичний університет МОЗ України, 58002, Україна, м. Чернівці, Театральна площа, 2.
 14. Немає.
 15. Кравченко О. В., Соловей В. М.
- Контактна особа:** Кравченко О. В., +380956593554.

Реєстр № 3/9/23

1. СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ПЕРВИННІЙ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ

2. НДР «Удосконалення напрямків діагностики первинної плацентарної дисфункції з урахуванням морфо-функціонального стану екстраембріональних структур і матково-плацентарного кровотоку у вагітних високої групи перинатального ризику в ранні терміни гестації», номер державної реєстрації: 0116U002933.

3. Акушерство та гінекологія.

4. 2+; С.

5. Інформаційний лист № 17-2021 випуск з проблеми «Акушерство та гінекологія». Спосіб профілактики перинатальних ускладнень при первинній плацентарній дисфункції / Кравченко О. В., Соловей В. М. - Підстава: витяг ЕПК «Акушерство та гінекологія» протокол № 1 від 27.01.2021 р.

6. Немає.

7. З метою профілактики перинатальних ускладнень при первинній плацентарній дисфункції вагітним основної групи призначали мікронізований прогестерон (в дозі 200-300 мг на добу інтравагінально), препарати Нормовен (по 1 таблетці 2 рази на добу), Артіхол (400 мг 2-3 рази на добу) і Магнікум (по 1 таблетці 3 рази на день). Негормональну терапію проводили циклами протягом 15-18 тижня, 25-28 тижня, 32-35 тижня. Гормональна терапія була поступово відмінена до 34 тижня гестації. Дана група вагітних була просанована до 16 тижня гестації. Жінки контрольної групи отримували лише мікронізований прогестерон. Лікування інфекцій проведено в даній групі відповідно до рекомендацій, які є специфічними для кожної нозології після 16 тижня гестації.

8. Перевагами використання даного методу є те, що мікронізований прогестерон забезпечує повноцінне проходження II хвилі інвазії цитотрофобласта та адекватний приріст матко-плацентарного кровотоку.

Венотонік Нормовен підвищує венозний тонус, попереджає тромбоз, зменшує веностаз та проникливість капілярів, покращує мікроциркуляцію. Артїхол підвищує активність медіаторного обміну, сприяє активізації енергетичних реакцій в організмі, нормалізації метаболічного статусу, спричиняє антиоксидантний ефект та профілактує виникнення внутрішньопечінкових холестазів. Магнікум забезпечує антистресову, антитромботичну та спазмолітичну дію, що сприяє ефективному зниженню судинної резистентності. Результати дослідження показали, що після проведення антибактеріальної терапії в основній групі обстежених рівень моноінфекцій знизився з 26,8% до 9,5%, рівень мікст-інфекцій з 56,1% до 20,7%, тоді як в контрольній групі ефективність антибактеріальної терапії, яка проведена після 16 тижнів була значно нижчою (відповідно моноінфекції зменшились з 27,5% до 17,5%, мікст-інфекції з 62,5% до 52,5%). *Медичний:* призначення запропонованої терапії вагітним з первинною плацентарною дисфункцією сприяє зниженню частоти гестозів з 32,5% до 16,7%, рівня передчасних пологів в 4 рази, затримки внутрішньоутробного розвитку та інфікування плода майже в 2 рази. *Соціальний:* покращення якості життя та здоров'я вагітних внаслідок зменшення ускладнень, а саме передчасних пологів, гестозів та затримки внутрішньоутробного розвитку плода та його інфікування. *Економічний:* скорочення фінансових витрат на перебування вагітних в стаціонарі у зв'язку з зниженням рівня перинатальних ускладнень.

9. Призначають мікронізований прогестерон в дозі 200-300 мг на добу інтравагінально, препарати Нормовен по 1 таблетці 2 рази на добу, Артїхол 400 мг 2-3 рази на добу і Магнікум по 1 таблетці 3 рази на день. Лікування інфекцій проводять відповідно до рекомендацій, які є специфічними для кожної нозології.

10. Вагітні з первинною плацентарною дисфункцією в I триместрі вагітності.

11. Індивідуальна непереносимість компонентів, що входять до складу препаратів.

12. Побічних ефектів не спостерігалось.

13. Буковинський державний медичний університет МОЗ України, 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2.

14. Немає.

15. Кравченко О. В., Соловей В. М.

Контактна особа: Кравченко О. В., +380956593554.