

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**



МАТЕРІАЛИ

**106-ї підсумкової науково-практичної конференції
з міжнародною участю
професорсько-викладацького колективу
БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
03, 05, 10 лютого 2025 року**

Конференція внесена до Реєстру заходів безперервного професійного розвитку,
які проводитимуться у 2025 році №1005249

Чернівці – 2025

УДК 61(063)
М 34

Матеріали підсумкової 106-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького колективу Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, 03, 05, 10 лютого 2025 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2025. – 450 с. іл.

У збірнику представлені матеріали 106-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького колективу Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, 03, 05, 10 лютого 2025 р.) зі стилістикою та орфографією у авторській редакції. Публікації присвячені актуальним проблемам фундаментальної, теоретичної та клінічної медицини.

Загальна редакція: професор Геруш І.В., професорка Годованець О.І., професор Безрук В.В.

Наукові рецензенти:

професор Батіг В.М.
професор Білоокій В.В.
професор Булик Р.Є.
професор Давиденко І.С.
професор Дейнека С.Є.
професорка Денисенко О.І.
професор Заморський І.І.
професорка Колоскова О.К.
професорка Кравченко О.В.
професорка Пашковська Н.В.
професорка Ткачук С.С.
професорка Тодоріко Л.Д.
професорка Хухліна О.С.
професор Черноус В.О.

ISBN 978-617-519-135-4

© Буковинський державний медичний
університет, 2025

Мандрик О.Є.

**АСОЦІАЦІЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ З КОНТАМІНАЦІЄЮ
HELICOBACTER PYLORI У ХВОРИХ НА ГАСТРИТ**

*Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб
Буковинський державний медичний університет*

Вступ. Доведено, що інфекція *Helicobacter pylori* (HP) дуже поширена серед усіх верств населення. Є вірогідні дані про участь інфекції *H. pylori* у розвитку сидеропенічних станів та залізодефіцитної анемії (ЗДА), які уражають, у тому числі, дитячу популяцію. Доведена роль інфекції *H. pylori* у розвитку ЗДА у дітей, і це дає можливість цілеспрямованого проведення заходів щодо зниження поширення інфекції HP та зниження ризику розвитку дефіциту заліза у групах високого ризику.

Мета дослідження. Вивчити ймовірний зв'язок між контамінацією *H.pylori* у хворих на гастрит та виникненням залізодефіцитних анемій.

Матеріал і методи дослідження. Проведено ретроспективний аналіз 302 медичних карт амбулаторних та стаціонарних хворих, які зверталися за медичною допомогою до КНП «Міська поліклініка №1» та лікувалися з приводу ерозивних неатрофічних гастритів у гастроентерологічному відділенні ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» у 2022-2023 рр. Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб (ПЗО). Середній вік обстежених осіб склав $(43,7 \pm 3,6)$ роки.

Результати дослідження. Аналіз результатів дослідження показав, що серед 302 осіб із хронічним неатрофічним гастритом контамінацію *H.pylori* було виявлено у 163 особи, що склало 53,9% (1 група), водночас, у 139 осіб тест на *H.pylori* був негативним (46,1%) (2 група).

У хворих на гастрит –HP із АС вміст заліза був істотно нижчим від показника у ПЗО у 2,0 рази ($p < 0,05$), при цьому показний сиваткового заліза в групі хворих на гастрит –HP без АС не відрізнялися від показника у ПЗО ($p > 0,05$). Зазначена ситуація супроводжувалася значним зниженням вмісту в крові транспортних форм заліза: вміст феритину відповідно у 1,3 та 1,2 рази ($p < 0,05$). Уміст трансферину в крові відповідав значенню показника у ПЗО при гастриті –HP без АС ($p > 0,05$), при гастриті –HP із АС був нижчим від показника у ПЗО у 1,3 рази ($p < 0,05$). Характерною ознакою змін ферокінетики при гастриті –HP є зниження показника НТЗ, яке за відсутності АС було нижчим за показник у ПЗО у 1,2 рази ($p < 0,05$), за наявності АС – у 1,5 рази ($p < 0,05$) та істотно відрізнялося від показника у відповідній групі хворих на гастрит +HP (вище у 1,2 рази $p < 0,05$), що підтверджує роль HP в механізмах розладів гомеостазу заліза.

Висновки. На основі проведеного ретроспективного аналізу медичних карт амбулаторних та стаціонарних хворих, які лікувалися з приводу *H.pylori*-асоційованих та не асоційованих захворювань шлунку та ДПК, можна стверджувати, що частота випадків анемічних станів за наявності контамінації *H.pylori* є істотно вищою у порівнянні з показником частоти анемічних станів при гастритах за відсутності контамінації *H.pylori* (39,9% проти 15,1%, $p < 0,05$) та у популяції. Серед хворих на *H.pylori*-асоційовані захворювання шлунку та ДПК залізодефіцитна анемія зареєстрована у 31,9% проти 8,6% на тлі не асоційованих з контамінацією *H.pylori*.

Патратій М.В.

**ЗМІНИ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ТОВСТОЇ КИШКИ
У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНО АСОЦІЙОВАНУ СТЕАТОТИЧНУ ХВОРОБУ
ПЕЧІНКИ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ**

Кафедра внутрішньої медицини

Буковинський державний медичний університет

Вступ. Метаболічно асоційована стеатотична хвороба печінки (МАСХП) є однією з найгостріших проблем сучасної терапії. У європейських країнах МАСХП діагностують майже у 11% пацієнтів. У людей з підвищеною масою тіла поширеність МАСХП становить