

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**



МАТЕРІАЛИ

**106-ї підсумкової науково-практичної конференції
з міжнародною участю
професорсько-викладацького колективу
БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
03, 05, 10 лютого 2025 року**

Конференція внесена до Реєстру заходів безперервного професійного розвитку,
які проводитимуться у 2025 році №1005249

Чернівці – 2025

УДК 61(063)
М 34

Матеріали підсумкової 106-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького колективу Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, 03, 05, 10 лютого 2025 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2025. – 450 с. іл.

У збірнику представлені матеріали 106-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького колективу Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, 03, 05, 10 лютого 2025 р.) зі стилістикою та орфографією у авторській редакції. Публікації присвячені актуальним проблемам фундаментальної, теоретичної та клінічної медицини.

Загальна редакція: професор Геруш І.В., професорка Годованець О.І., професор Безрук В.В.

Наукові рецензенти:

професор Батіг В.М.
професор Білоокій В.В.
професор Булик Р.Є.
професор Давиденко І.С.
професор Дейнека С.Є.
професорка Денисенко О.І.
професор Заморський І.І.
професорка Колоскова О.К.
професорка Кравченко О.В.
професорка Пашковська Н.В.
професорка Ткачук С.С.
професорка Тодоріко Л.Д.
професорка Хухліна О.С.
професор Черноус В.О.

ISBN 978-617-519-135-4

© Буковинський державний медичний
університет, 2025

Кравченко О.В.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА КОРЕКЦІЮ ПОРУШЕНЬ
ВАГІНАЛЬНОГО БІОТОПУ В ПЕРИМЕНОПАУЗІ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології
Буковинський державний медичний університет

Вступ. Забезпечення якості життя жінок клімактеричного періоду залишається сьогодні найактуальнішою проблемою сучасної медицини. За даними ВООЗ жінки проводять третину свого віку у стані дефіциту статевих гормонів. В 2030 р. у світі в менопаузальному періоді перебуватиме 1,2 млрд жінок (1/6 населення планети).

В перименопаузальному періоді відбуваються зміни складу вагінального мікробіома. Знижується концентрація глікогена в клітинах епітелію, створюються небагатоприємні умови для розвитку глікогенспоживаючих бактерій, піхве середовище стає нейтральним чи слаболужним. На фоні зниження загального рівня облігатних мікроорганізмів починають домінувати умовно-патогенна та транзиторна мікрофлора.

Мета дослідження. Оцінити ефективність антисептичного засобу, діюча речовина – декаметоксин, при лікуванні змішаної вульвовагінальної інфекції у жінок в перименопаузі.

Матеріал і методи дослідження. Під нашим спостереженням було 52 пацієнтки в перименопаузальному періоді, віком від 44 до 52 років. Діагноз неспецифічної бактеріально-кандидозної інфекції верифікований за даними клініко-лабораторних методів дослідження. Всі вищезначені хворі отримували препарати декаметоксину по 50-100 мл підігрітий до температури тіла 3 рази на добу у вигляді зрошень/мікроіригацій у ділянці зовнішніх статевих органів (вульви), та вагінальний гель 5 мл 1 раз на добу 7 днів.

Результати дослідження. Ефективність лікування оцінювали за даними клінічного обстеження до лікування, на 7 день спостереження та лабораторними (бактеріоскопічними, бактеріологічними) даними до та після лікування. Критеріями ефективності лікування була повна клінічна та бактеріальна санація.

Аналіз клінічної ефективності запропонованої терапії показав, що дискомфорт у піхві спостерігався лише у-19,2% пацієнток, тоді як, до лікування цей показник становив -84,6%.

Диспареунія діагностувалася у 5,2% жінок (до лікування у 69,2%), такий симптом, як вагінальні виділення зменшився у 5 разів. Регенераторна ефективність (показник зрілості піхвового епітелію) зріс на 10-20%.

Результати мікробіологічного дослідження піхвового вмісту також показали достовірне зниження *Candida albicans*, умовно-патогенної грампозитивної, грамнегативної мікрофлори.

Лактобактерії в кількості 10^7 КУО/мл були у 72,6% обстежених, що свідчить про швидке відновлення нормальної вагінальної мікрофлори.

Висновки Антисептичний засіб, діюча речовина – декаметоксин у жінок в перименопаузі демонструють високу мікробіологічну ефективність при змішаній бактеріально-кандидозній інфекції, підвищують функціональну активність епітелію слизової оболонки піхви, що особливо важливо для даного періоду життя жінок.

Лісова К.М.
НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ

Кафедра акушерства та гінекології
Буковинський державний медичний університет

Вступ. Перинатальні втрати суттєво впливають на фізичне та психологічне здоров'я жінок. Тому важливо в ранніх термінах діагностувати загрозливі стани і вчасно проводити їх лікування. В генезі невиношування важливу роль відіграють порушення функції системи мати-плацента-плід та плацентарна дисфункція, що формується на цьому тлі. При цьому спостерігаються розлади усіх функцій плацентарної системи, зокрема антитоксичної, ендокринної, транспортної, метаболічної, трофічної.